




*6p. 20*

JOHN GOODSIR.


HARRY D. S. GOODSIR.

R33422









*John Goodwin*  
MEDICINÆ PRAXEOS

COMPENDIUM,

SYMPTOMATA, CAUSAS, DIAGNOSIN,  
PROGNOSIN, ET MEDENDI  
RATIONEM, EXHIBENS.

---

AUCTORE

E. G. CLARKE, M. D.

Collegii Regalis Medicorum Londinensis, nec  
non Exercitus, Medico.

---

EDITIO TERTIA,  
PLURIMUM AUCTA ET EMENDATA.

---

LONDINI,

Excudebat Gulielmus Nicholson:

PRO OGLE, CUTHEL & MARTIN, CALLOW, COX et  
MURRAY: et GUTHRIE & TAIT, et OGLE & AIK-  
MAN, EDINBURGI.

1805.

Henry Goodson. 16.  
Ainsturher  
24<sup>th</sup> October - 1836

John Goodson Junr  
From his Friend

Mr. Robert Nassmyth.

19<sup>th</sup> March 1809.

Presented to Henry  
Duncan Spens Goodson  
by his affectionate  
Father —

12 Nov 1838. —



V I R O

*Ornatissimo et Peritissimo,  
Nec non Patrono suo perpetim colendo,  
THOMÆ KEATE, ARMIGERO,  
Reginæ,  
Principis Walliæ,  
Ducis Eboraci, et Ducis Clarenciæ,  
Chirurgo,  
Exercitus Chirurgo Generali, &c. &c.*

HOC OPUS,

*Plurimum auctum et emendatum,  
Ob amicitiam verissimam,  
Plurimaque in se collata beneficia,  
Grati animi Monumentum,  
D. D. C. que*

*AUCTOR.*

LONDINI, Junii 4to, 1800.

# INDEX CAPITUM.

## CLASSIS I. PYREXIÆ.

ORDO	I.	Febres	-	-	-	-	Page 1
	II.	Phlegmasiæ	-	-	-	-	19
	III.	Exanthemata	-	-	-	-	74
	IV.	Hæmorrhagiæ	-	-	-	-	99
	V.	Profluvia	-	-	-	-	122

## CLASSIS II. NEUROSES.

ORDO	I.	Comata	-	-	-	-	127
	II.	Adynamia	-	-	-	-	133
	III.	Spasmi	-	-	-	-	139
	IV.	Vesaniæ	-	-	-	-	167

## CLASSIS III. CACHEXIÆ.

ORDO	I.	Marcores	-	-	-	-	173
	II.	Intumescentiæ	-	-	-	-	176
	III.	Impetigines	-	-	-	-	190

## CLASSIS IV. LOCALES.

ORDO	I.	Dysæsthesiæ	-	-	-	-	205
	II.	Apocenoses	-	-	-	-	208
	III.	Epischeses	-	-	-	-	210
	IV.	Dialyses	-	-	-	-	216 .16.

# MEDICINAE PRAXEOS

## COMPENDIUM

---

### CLASSIS I. PYREXIÆ.

#### CHARACTER.

Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones læsæ, viribus præsertim artuum imminutis.

### ORDO I. FEBRES.

#### CHARACTER.

Prægressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

### CAPUT I. INTERMITTENTES.

#### TERTIANA.

#### SYMPTOMATA.

**S**TADIUM primum oscitatione, pandiculatione, lassitudine, debilitate, habitus externi extenuatione, dorsi, digitorum apicum dolore vel molestiæ sensu  
A incipit;

incipit; hæc subsequuntur rigor, horror, frigorisque sensus in dorso primum tunc in corpus totum quando revera inagis calet; nausea, vomitus, capitis, lumborum, artuumque dolor comitantur; respiratio difficilis fit et anxiosa, pulsus citatus, debilis ac parvus et urina limpida; frigore gradatim recedente excipit stadium alterum; calor urget intensus, pulsus fit plenus, validus atque durus, respiratio magis libera sed anxiosa; superficies rubra et turgida; lingua alba, sicca; sitis magna, capitis dolor immanis, nonnunquam etiam delirium, comitantur, et urina rubella demittitur; ægro fere exarescente stadium tertium incipit, sudor erumpit copiosus, urina sedimentum lateritium deponit; restituntur omnes secretiones, sublevantur symptomata et sudore cessante omnino tolluntur, debilitatis solummodo sen-

su

su manente. Paroxysmi sunt similes intervallo quadraginta octo circiter horarum et accessionibus meridianis. Intermittentes in vernaes et autumnales sunt interstinctæ.

## CAUSAE.

Debilitas; effluvia ex paludibus vel agris humidis exhalata, atmosphæra humida; frigus externe admotum, contagium et impulsus fortasse lunaris.

## PROGNOSIS.

Symptomata fausta sunt, paroxysmi regulares non supra horas duodecim perdurantes; pustulæ morbo decedente circa labia erumpentes; urina sedimentum deponens: Infausta sunt, coma, delirium, anxietas magna, singultus, tonsillarum tumor, alvus pertinaciter astricta, hypochondrii et epigastrii paroxysmo durante tensio et dolor; cibi

aversatio vel debilitas vertigine in intermissionibus comitata; macularum crebra eruptio urticationem referentium.

#### CURA.

Primæ viæ lenibus emeticis et cathartics sunt purgandæ et in intermissione tonica præcipue cinchona; amara; astringentia largis dosibus sunt administranda; si hæc nihil valeant arsenicum; zincum vitriolatum; hydrargyri præparationes: finis paroxysmo imponatur si datum sit emeticum in gradu frigido, vel opii dosis plena in gradu calido: si adsit diathesis phlogistica venæ sectio est peragenda; si magna superveniat debilitas diæta nutriens est utenda: si coma vel delirium, epispastica, cardiaca. Ad recidivam præcavendum cinchona vel alia ejusmodi remedia breve sunt administranda;

ministranda; causis excitantibus studiose evitatis. An arteriarum femoris et brachii compressio? an aquæ frigidæ affusio stadio secundo?



### QUARTANA ET QUOTIDIANA.

In iis paroxysmi sunt similes, sed in quartana intervallum septuaginta duarum circiter horarum excipit accessibus pomeridianis: in quotidiana intervallum viginti quatuor circiter horarum subsequitur paroxysmis matutinis: Medendi ratio est eadem ac in tertiana, sed quartana sanatu longe difficilior est, quam vel quotidiana, vel tertiana.



### CAP. II. SYNOCHA.

#### SYMPTOMATA.

Ab horrore perquam insigni incipit;  
calore

calore intenso, vultu rubro turgente, cephalalgia, lumborum, dorsique dolore, oculorum rubedine, lucis impatientia, sequentibus: cutis, lingua, fauces que sunt aridæ; sitis magna, tussis sicca, anorexia, nausea, vomitus, anxietas, inquietudo et jactatio molesta urgent; olfactus evadit imminutus, alvus plerumque astricta, urina rubra, pulsus frequens, validus et durus; sensorii functiones parum sunt turbatæ et sanguis detractus crusta albida vel subflava est obductus.

#### CAUSAE.

Evacuationes consuetæ subito suppressæ; perfrigeratio calefacto corpore; labor intensus corporis animique; insolatio; eruptiones subito repulsæ; animi pathemata violenta; diæta valde spiritiuosa vel helluatio.

DIAGN.



## DIAGNOSIS.

Ab typho, pulsu valido, calore, doloribus intensis, siti magna et sensorii functionibus parum turbatis, dignoscitur.

## PROGNOSIS.

Morbus circa diem septimum, hæmorrhagia, sudore, urina sedimentum deponente, rarius alvi fluxu, fauste frequenter solvitur: Respiratio valde laboriosa, dolor capitis immanis cum delirio feroci, urina pallida et diluta, abdominis viscerumque affectiones et cutis ante diem septimum flavedo, infausta sunt signa.

## CURA.

Venæsectio generalis repetita secundum ægri ætatem, corporis habitum, consuetudinem vivendi, anni tempestatem et morbos tunc temporis frequentes,

quentes, et si urgeat capitis dolor hiru-  
dines temporibus sunt admovendæ;  
tunc emeticum; cathartica seu enema-  
ta laxantia indies si opus sit; antimo-  
nium tartarisatum portiunculis ad nau-  
seam tantum non ciendum; sales me-  
dii; diluentia tepida acidis adjunctis;  
corporis animique quies; regimen an-  
tiphlogisticum: si delirium, thoracis  
vel abdominis affectiones urgeant, san-  
guinis missione, laxantibus, vesicato-  
riis et pediluviiis sunt admovendæ: an  
barytes muriata? an digitalis? an hy-  
drargyri præparationes ad lenem salivæ  
fluxum ciendum?



### CAP. III. TYPHUS MITIOR.

#### SYMPTOMATA.

Sub initio signa sunt, debilitas, languor,  
lassitudo

lassitudo inusitata, appetitus prostratus, reditus frequentes frigoris leviset caloris alternorum abnormes, animi dejectio cum suspiriis reiteratis; elapsis diebus aliquot, æger, capitis dolore vel vertigine, frigorisque sensu præsertim occipitis, nausea, pituitæ insipidæ vomitu, magnaue virium prostratione, tentatur; calor parum auctus est, sitis nulla urget, lingua in initio humida est crustaque alba obducta, postea sicca, rubra et aliqua in parte fissa, vultus pallidus atque depressus, pulsus parvus, debilis plerumque frequens, respiratio laboriosa cum constrictionis circa præcordia sensu, urina parum mutata et sensorii functiones plurimum turbatæ, comitantur.

## CAUSAE.

Affectus animi contristantes; diæta tenuis;

nuis; vita sedentaria; evacuationes nimiae; venus immodica; contagium; atmosphæra calida et humida; sanguinis paucitas.

## DIAGNOSIS.

Ab typho graviori, lento ejus impetu, rigoribus minus intensis, siti nulla et omnibus signis levioribus, distinguitur.

## PROGNOSIS.

Symptomata bona sunt, lingua, cutisque humidæ; pulsus tardior et magis validus post diaphoresin lenem vel cardiacorum administrationem; pustulæ circa labia naresque; eruptio miliaris sine sudore profuso; surditas; salivatio libera sine aphthis. Mala sunt, delirium cito comparens et perdurans; evacuationes profusæ pulsu debili stipatæ; subsultus tendinum; manuum, linguæque

que tremor; venatus floccorum volitantium; pervigilium; oculorum stupor; cæcitas; coma; deglutitio impedita præcipue singultu comitante; petechiae.

## CURA.

Emetica præcipue sub morbi initium nunquam sunt prætermisso; primæ viæ laxantibus et clysmatibus emollientibus sunt deplendæ; diæta nutrienda foret; cardiaca præcipue vinum et opium portiunculis tertia quaque hora repetita alternatim; epispastica parva repetita; pediluvia vel crurum fots præcipue si urgeant jactatio et vigilia; corporis aqua tepida et aceto lavatio et postea ejus perexsiccatio; gas oxygenium; acida mineralia; cerevisia lagenaria, cerevisia pini laricis etc; spuma cerevisiæ effervescentis: remissione comparente

comparente vel lingua, cutique humidis cinchona libere est adhibenda. Nuper in pyrexiae exacerbatione, quæ, die advesperascente, vultus erubescencia, siti et inquietudine auctis, notatur, aquæ frigidæ corpori nudato affusio summo cum fructu usurpata fuit præcipue si corpus sit præter naturam calidum; aqua frigida libere est haurienda: an capsici grana pauca secunda quaque hora vel sæpius in forma pilulæ? an calomelas parvis et repetitis dosibus ad morbi catenationem cohibendum? an murias potassæ oxygenatus?



#### CAP. IV. TYPHUS GRAVIOR.

##### SYMPTOMATA.

Rigores sub initium magis sunt vehementes

mentes quam in typho mitiori, quos excipiunt calor intensus et mordax; pulsus durus, parvus, debilis, plerumque frequens et abnormis; capitis temporumque dolor; vibrant arteriæ carotidæ temporales que, maxima virium prostratio et debilitas, animus anxius, dejectus, pessima quaevis ominans, nausea, vomitus bilis subviridis vel nigri coloris comitantur; oculi inflammantur et circa orbitæ fundum dolent, vultus est inflatus et cadaverosus; dorsum, artus, cordisque scrobiculus dolent; cutis arida est cum ingrato calore pungenti; sitis inextinguibilis cum oris sapore ingrato vexat: lingua primo alba, postea arida, nigra que; dentes, labiaque, sorde tenaci oblinuntur; vertigo, aurium tinnitus, respiratio laboriosa suspiriis interrupta urgent; urina primo pallida, postea rubra vel nigra, sedimentum fuliginereum vel foetidum

foetidum deponit; morbo in gravescente delirium vel potius stupor et humorum putredinis signa accedunt, qualia sunt petechiæ, maculæ, vibices, aphthæ circa os et fauces nigri coloris cum deglutitione impedita, urina et alia excreta sanguine tinguntur; fæces sunt immodice foetidæ; hæmorrhagiæ gingivis et intestinis profluunt.

## CAUSAE.

Victus pravus et putridus; aër humidus calidusque; debilitas; effluvia animalium et vegetabilium; diæta tenuis; evacuationes immodicæ; venus immoderata; contagium.

## DIAGNOSIS.

Historia supra tradita, ad hanc febrem ab typho mitiori et synocha distinguendum, sufficit.

## PROG-



## PROGNOSIS.

Color fæcum luteus vel fuscus; diaphoresis lenis; salivatio; parotidum, axillarum vel inguinum glandularum suppuratio; eruptiones circa labia, naresque; stupor; surditas; petechiarum color nitidus; urina sedimentum deponens, fausta sunt symptomata. Sitis nulla; petechiæ nigræ magna copia vel eorum recessio subita cum pulsu valde debili; aphthæ lividæ; faucium inflammatio; respiratio valde difficilis cum narium pinnarum motu magno; magna debilitas; dejectiones liquidæ abdomine tenso; decubitus in dorsum membris extensis; sudores profusi; urina foetida; hæmorrhagiæ; coma altum; tendinum subsultus; odor corporis cadaverosus; infausta sunt symptomata.

## CURA.

Emeticum sub morbi initium est propinandum, et paucis horis elapsis calomelanos grana tria vel quatuor conserva vel mucilagine commisti sunt administranda; laxantia indies, ut rhabbarum et similia seu enemata initia, ad intestina deplendum materiæ putridæ vel putrescentis quæ jam in corpore subest, sunt uti; antiseptica et cardiaca, qualia vinum, opium, cinchona, ut in typho, libere sunt datu: gas acidum carbonicum in ventriculum acceptum et per anum injectum; refrigerantia, qualia, acida mineralia; sales medii: diæta nutriens; lavatio frigida vel aquæ frigidæ corpori nudato affusio ut in typho mitiori; mundities summa præ omnibus est; aër cubiculi foret purissimus; et morbo decedente  
seu

seu debilitate magna superveniente  
epispastica parva repetita: Diarrhoea,  
laxantibus, acidis et opiatis sublevan-  
da: Delirium, pediluviiis, crurum fotu  
et epispasticis.



## CAP. V. SYNOCHUS.

### CHARACTER.

Morbus contagiosus, febris ex synocha  
et typho composita, initio synocha,  
progressu et versus finem typhus.

### CURA.

Hujus morbi medela secundum ejus  
typum est dirigenda sed venæsectio  
summa cum cautela est peragenda.

CAP.

## CAP. VI. FEBRIS REMITTENS.

Hæc iisdem cum symptomatibus ut febris intermittens incipit, causæ et mendi ratio sunt similes.



## CAP. VII. FEBRIS HECTICA.

## CHARACTER.

Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis et vespertinis; remissione, rarius apyrexia matutina; plerumque cum sudoribus nocturnis et urina sedimentum furfuraceo lateritium deponente.

Symptoma solummodo est Phthiseos et alio in loco tractabitur.

ORDO

## ORDO II. PHILEGMASIÆ.

## CHARACTER.

Febris synocha; phlogosis, vel dolor topicus, simul læsa partis internæ functione; sanguis missus et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens. Species sunt Phlogosis (Phlegmone) et Erythema seu Erysipelas.



## CAP. I. PHLEGMONE.

## CHARACTER.

Synocha, rubore vivido, tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, sæpe in apostema abeunte; dolore sæpe pulsatili; resolutione, suppuratione et gangræna terminato: quando resolutione terminatur, decedit inflammatio partis textura integra manente; sin au-  
gescant

gescant symptomata, tumore ad apicem elevato cum pulsatione et rigoribus frequentibus, sequetur suppuratio, et pure formato, remittit dolor, tumor albescent, mollis, fluctuans et pruriens evadit: expectanda est gangræna, rubedine, calore, dolore, tensioneque sublati, et gangrænâ formatâ pars affecta nigrum, lividumve colorem induit, cum sensilitatis privatione, cuticulâ simul vesiculis obsitâ.

## CAUSAE.

Materiæ acris parti applicatio; vis externa; corpora extranea in corpore sita; frigus et causæ quæ synocham inducunt.

## PROGNOSIS.

Periculum majus est si partes ad vitam inservientes afficiantur, gangrænæ proclivitas

clivitas ab signis supra memoratis intelligetur; in internis inflammationibus plus periculi subest quam in externis.

## CURA.

Ad resolutionem promovendum regimen antiphlogisticum stricte est adhibendum; venæsectio secundum ægri vires et symptomatum violentiam; hirudines parti affectæ; cathartica; diluentia; refrigerantia; discutientia externe ut cerussa acetata, acetum, etc. Suppuratio, cataplasmatibus emollientibus et fomentis est promovenda: Gangræna, tonicis et antisepticis est amovenda, quorum optima sunt vinum; cinchona; opium: an moschus et ammonia præparata largis dosibus?

## CAP. II. ERYTHEMA.

## SYMPTOMATA.

Partis affectæ splendor et rubor pressione evanescens sed cito rediens; tumore vix evidente cum dolore urente, inordace; ambitu inæquali, ex uno in alium locum vicinum serpente, in cuticulæ squamulas vel vesiculas raro in gangrænam abeunte: Hæc est sola cutis affectio; quando afficitur systema erysipelas appellatur.

## CAUSAE.

Materia acris cuti applicata vel ex internis emissa; relaxantia.

## CURA.

Regimen antiphlogisticum; applicatio topica amyli vel lapidis calaminaris;  
cinchona



cinchona : si adsit diathesis phlogistica, venæsectio, cathartica, diluentia et similia sunt usurpanda.



### CAP. III. OPHTHALMIA MEMBRANARUM.

#### SYMPTOMATA.

Tunicæ adnatæ rubor, ardor, oculique dolor, muscæ vel spinæ in eo inhærentis sensus; lachrymarum effusio; lucis intolerantia; nonnunquam pyrexia vehemens. Idiopathica vel symptomatrica est.

#### CAUSAE.

Externa violentia; aliena corpora in oculum insinuata; fumi metallici; palpebrarum intus conversi pili; ebrietas; lucis intentior intuitus; variola; scrophula; syphilis.

#### CURA.

## CURA.

Si sit affectio idiopathica; sanguinis missio generalis et topica; adnatæ vascorum scarificatio; alvi purgatio; vesicatoria pone aures, irritationis omnis præcipue lucis evitatio: applicationes topicæ, quales, cerussa acetata, zinci præparationes, etc. aquasolutæ: opiata interne et tinctura thebaica prioris Ph. Lond. topice; regimen antiphlogisticum. Si superveniret parti affectæ erysipelas, tonica, qualia, cinchona, balneum frigidum, oculi aquâ frigidâ lavatio et similia sunt utenda et astringentia supra memorata: quando sit signum luis venereæ hydrargyri præparationes sunt utendæ: quando scrophulæ sit symptoma, tonica, cicuta, aquæ chalybeatæ et externe cataplasma aluminis vel oxalis acetosellæ, unguentum

unguentum hydrargyri nitrati et similia sunt admovenda.



#### CAP. IV. OPHTHALMIA TARSI.

##### CHARACTER.

Signis supra memoratis addi possunt, tarsi palpebrarum tumor, erosio et exudatio glutinosa; adnatæ inflammatio minus violenta.

##### CURA.

Medendi ratio eadem est ac in priori specie nisi quod ulcera præparationes cupri, hydrargyri et zinci postulant; palpebrarum adhesionem durante somno obviamitur, illinendo eas unguento tutiæ vel spermatis ceti.

## CAP. V. PHRENITIS.

## SYMPTOMATA.

Pyrexia vehemens, dolor capitis intensus; rubor faciei et oculorum; aurium tinnitus; vultus ferox; soni, lucisque intolerantia; pervigilium; delirium ferocissimum; vires maximæ; arteriarum carotidum et temporum pulsatio; respiratio laboriosa; lingua arida et fusca; pulsus plerumque celer et durus, nonnunquam mollis.

## CAUSAE.

Causæ remotæ sunt omnes quæ synocham producunt; animi pathemata violenta; insolatio; nimia potatio; vis externa capiti illata; tempestas fervida; nocturna studia. Causa proxima est cerebri ipsius vel membranarum ejus affectio.

## DIAGNOSIS.

## DIAGNOSIS.

Ab mania dignoscitur pyrexia violenta; et ab synocha delirio feroci sub initium accedente.

## PROGNOSIS.

Signa fausta sunt, sudores universi; diarrhœa copiosa; epistaxis; urina sedimentum deponens. Signa infausta sunt, vomitus æruginosus; fæces albæ vel cinereæ; sputatio indecora in adstantes; pupilla ampla ad lucem immota; masticatio continua cum oris spuma; floccorum volitantium venatus; oculi pulverulenti; potus pertinax recusatio; deglutitio laboriosa; tremor; convulsio; coma; subsultus tendinum: ab pneumonia lethalis.

## CURA.

Phenæsectio larga, vulnere adeo amplo

ut plurimus sanguis per id brevi effluat repetita; hirudines temporibus vel cucurbitulæ cruentæ postea sunt admovendæ; alvi purgatio; epispastica capiti raso; pediluvia; regimen antiphlogisticum; diluentia: applicationes externæ, ut lintea in aceto et aqua perfrigida madefacta capiti adnota. et debilitate magna superveniente opii tincturæ guttæ paucæ frequenter: corpus erectum tenendum est.



## CAP. VI. CYNANCHE TONSILLARIS.

### SYMPTOMATA.

Membranæ faucium mucosæ præcipue tonsillarum dolor, tumor, rubor; devorandi difficultas; angustiae in faucibus sensus; oris, fauciumque viscositas; au

is internæ dolor; assidua et molesta nuci excretio; synocha; tumor primum vulgo in alterutra tonsilla compareret ubi decrescens in alteram transit, inflammatio nonnunquam magnopere procedit ut spiritus afficiatur.

## CAUSAE.

Omnes causæ quæ inflammationem producant; frigus collo applicatum; exercitatio vehemens oratoria; stimuli gutture inhærentes; ætas juvenilis.

## DIAGNOSIS.

Ab cynanche maligna distinguitur pulsu forti; pyrexia quæ in hoc morbo synocha est in altero typhus; ulcerum absentia.

## PROGNOSIS.

Terminatur frequentissime resolutione,

suppuratione, raro gangræna; pyrexia lenis, respiratio libera, tumor externus, fausta sunt symptomata.

## CURA.

Sanguinis missio topica; vomitoria præcipue sub morbi initium; epispastica et rubefacientia collo admota; alvi purgatio præcipue cum calomelane; regimen antiphlogisticum; gargarsimata astringentia; vaporis aquæ calidæ et aceti inhalatio: si minuetur suppuratio fomenta et cataplasmata sunt utenda: si metuetur suffocatio tonsillarum scarificatio vel ætheris et aquæ calidæ inhalatio: an bronchotomia?



## CAP. VII. CYNANCHE MALIGNA.

## SYMPTOMATA.

Horrores crebri, nausea, anxietas, vomitus



mitus, prima sunt indicia morbi; eodem tempore vel brevi post, cervicis rigor, faucium molestia et raucedo incidunt; fauces alte sunt rubrae, parum tumidae, deglutitio parum difficilis; mox supra partes affectas, maculae albae vel cinereae, serpentes, coeuntes comparent, et fauces crustis crassis obducunt; his decedentibus, ulcuscula subjacentia sese ostendunt; nunc temporis coryza acris humorem foetidum effundens, labia, naresque rodit; infantes diarrhoea tentantur; pyrexia procedente cum pulsu parvo, crebro et abnormi; respiratio strepens et rauca evadit, symptomata vespere adventante ingravescent et mane remittunt; magna virium prostratio, delirium et coma superveniunt; secundo, tertiove die primo circa faciem, columque efflorescit cutis, maculis clare rubris, serpentibus, tandem coeuntibus, corpus

corpus totum obducentibus, manibus, extremisque digitis rigentibus et tumidis: eruptio circa diem quartum plerumque disparet, et cuticulâ desquamatur; pyrexia, eruptione accedente vel decedente, raro imminutâ; morbo procedente putredinis symptomata accedunt et æger inter diem tertium et septimum e vivis eripitur.

#### CAUSA.

Contagium.

#### DIAGNOSIS.

Ab cynanche tonsillari dignoscitur pulsu, deglutitione parum difficili, maculis cinereis et serpentibus, respiratione strepente et febris typo.

#### PROGNOSIS.

Periculum pyrexiae violentia et gangræ-  
næ

næ proclivitate est æstimandum; ulcerum livor; spiritus et coryza fœtide olentes; diarrhœa violenta; delirium et coma perdurantia; anxietas permagna et inquietudo, funestum morbi eventum denunciant. Signa fausta sunt, mitior ulcerum species; eruptione prodeunte febris remissio; eâ in squamulas abeunte cum altera remissione; sudores lenes universi; crustis a faucibus delapsis, somno, cibi desiderio et aliis bonis notis redeuntibus.

## CURA.

Emetica repetita; laxantia vel enemata lenia, alvo postulante; putredini occurratur cinchona, vino, opio, gargarismatibus antisepticis et stimulantibus præcipue ex capsico vel polygala senega paratis: epispastica invicem excipientia; pediluvia; mundities summa: aëris puri

puri libera admissio et alia remedia ad typhum graviolem aptata: ulcerum fœtor, injectione frequente aluminis in aqua soluti, amovetur, nempe aluminis uncia dimidia ad aquæ libram unam. An aquæ frigidæ corpori nudato affusio?



## CAP. VIII. CYNANCHE TRACHE- ALIS.

### SYMPTOMATA.

Adoritur plerumque infantes lactationis tempore peracto, nonnunquam vero adultos, cum dolore ad partem tracheæ superiorem obtuso, tumore fere nullo in faucibus apparente, supervenit rauco clangosa, loquelam, tussimve comitans, quasi ex tubo metallico vox prodiret, quæ galli cantui confertur; huic accedit

cedit respirationis difficultas cum inspiratione strepente; tussis brevis, interrupta, plerumque sicca urget, siquando adsit expectoratio, ejicitur materies purulenta fimbriis membranaceis mista, facies livida fit vel rubra, adsunt sitis magna, caloris sensus ingratus et inquietudo; deglutitio parum, minimumve impeditur; in faucibus nihil morbidum ut plurimum conspicitur aliquando tamen tumor et rubor; urina primo est limpida postea turbida; pulsus frequens est et debilis; synocha: sensibus illæsis fru-  
itur æger et nonnunquam cum strangulationis in faucibus sensu subito abripitur.

## CAUSAE.

Frigus; atmosphæra frigida et humida; ætas infantilis.

## DIAGNOSIS.

## DIAGNOSIS.

Peculiari vocis sono et constrictionis circa laryngem sensu facile dignoscetur.

## PROGNOSIS.

Respiratio cum strepitu valde difficilis; anxietas magna; pyrexia vehemens; infausta sunt symptomata: membranaceæ materiæ expectoratio, respiratio libera; vox parum mutata, fausta sunt omnia.

## CURA.

Hirudines quam prope parti affectæ sunt admovendæ; emetica, ad vomitionem, nauseamque ciendum; vesicatoria; rubefacientia; refrigerentia; alvi purgatio lenis; aquæ calidæ vaporis inhalatio; bálneum tepidum; antispasmodica præcipue moschus, asafoetida maxime sunt confidenda. Ubi hoc morbo

morbo conflictati sunt adulti, sanguinis missio, et alia pro synocha remedia, abjecta procrastinatione, uti sunt. An calomelanos grana pauca frequenter? An polygalæ senegæ vel daphnes mezerei decoctum ad vomitionem posteaque nauseam vel alvi lenem purgationem promovendum?



## CAP. IX. CYNANCHE PHARYNGÆA.

### SYMPTOMATA.

Rubor in imis præsertim faucibus; deglutitio maxime impedita, dolentissima; respiratio satis commoda; febris synocha: easdem causas ut cynanche tonsillaris agnoscit et eandem medendi rationem postulat.

CAP.

## CAP. X. CYNANCHE PAROTIDÆA.

## SYMPTOMATA.

Tumor externus parotidum et maxillarum glandularum magnus, primo in maxillæ inferioris angulum comparens; respiratione et deglutitione parum læsis; febre synocha plerumque leni: faucium tumore recedente, mammæ in foeminis et testes in maribus afficiuntur.

## PROGNOSIS.

Pyrexia vehemens vel phrenitis tumoris mammarum vel testium retrocessioni superveniens malum est.

## CURA.

In genere solummodo requiritur regimen antiphlogisticum; atsi, mammarum aut testium tumore recedente, augeatur pyrexia cum phrenitidis signis  
vel



vel stupore, capitis fomenta, vesicatoria et alia ei affectioni idonea sunt usurpanda.



## CAP. XI. PNEUMONIA.

### SYMPTOMATA.

Rigore, horrore, aucto calore, aliisque synochæ signis adoritur; paucis horis elapsis subsequuntur symptomata jam jamque memoranda; dolor lateris acutus, fixus, pungens; (nonnunquam vero obtusus cum ponderis sensu) sæpissime sextam aut septimam costam occupans, quandoque hinc ad scapulas, illinc ad sternum aut claviculas jaculans, respiratio perpetuó difficilis sub inspiratione aucta, sæpe non nisi trunco corporis erecto exercenda; decubitus in latus affectum vel integrum molestus, nonnunquam

quam in dorsum commodior ; tussis major, minorve ab initio comitatur, primó expectoratio est nulla vel parca, postea materies sputo rejecta colore variat et sæpe sanguine tingitur, facies tumida est et purpurei coloris; anxietas et inquietudo urgent, pulsus fit frequens, plenus, durus atque citatus, nonnunquam vero mollis et debilis : terminatur resolutione, suppuratione, gangræna, effusione vel exudatione ab pleuræ interna superficie. Sub titulo pneumoniæ, complectuntur pleuritis et peripneumonia.

## CAUSAE.

Causæ remotæ sunt anni tempus certum, hyems et ver; temperamentum sanguineum; perspiratio imminuta aut suppressa; ætas inter quadraginta et sexaginta; exercitatio vehemens pulmonum; causæ synocham inducentes; frigoris

goris et caloris vices ; morbi priores. Causa proxima est pleuræ vel pulmonum inflammatio.

## DIAGNOSIS.

Ab hepatitide dignoscitur difficili in latius affectum decubitu, dolore non pressione aucto ; singultu ; partis situ.

## PROGNOSIS.

Pyrexia vehemens, respiratio valde difficilis ; tussis crebra, vehemens, dolores exasperans ; dolor ab altero latere in alterum transgressus ; anxietas et inquietudo auctæ ; delirium ; respiratio repente curta et celeris, infausta sunt symptomata. Materiæ subflavæ, spissæ sanguinis aliquantulo tinctæ sine tussi vehementi expectoratio libera ; hæmorrhagiæ naribus vel venis hæmorrhoidalibus ; diarrhœa biliosa ; urina sedimentum

tum deponens, vel eruptio erysipelatosae partes externas occupans, fausta sunt signa.

Suppurationem futuram denunciant inflammationis symptomata perstantia ad diem decimum quartum sed aliquandiu moderatius; jam factam testantur doloris et sputi remissio, spirandi difficultate manente, horrores leves, febris hectica, tussis et dyspnœa auctæ, decubitus in latus affectum facillimus et ponderis sensus in thorace: effusionis symptomata suffocationem inducentia sunt respiratio subitò abbreviata, accelerata, non nisi trunco corporis erecto exercenda, pulsus debilis et maxime frequens.

#### CURA.

Sanguinis missio cita, larga, repetita, secundum symptomatum violentiam et  
ægri

ægri vires, hirudines vel cucurbitulæ cruentæ ad partem affectam sunt admovendæ; epispastica repetita thoraci applicata; laxantia lenia et enémata emollientia? diluentia tepida acido vegetabili graté reddita; demulcentia mucilaginosa; regimen antiphlogisticum; vomitoria ut antimonium tartarisatum refracta dosi ad nauseam solummodo ciendum; expectorantia; aquæ calidæ vapores ore in pulmones sunt accipiendi; pediluvia. Si tussis urgeat, spirandi difficultate et pyrexia subductis, opiata: ægro magnopere debilitato, guttæ quinque tincturæ opii hora sexta pomeridianâ indies summo cum fructu datæ fuerunt: ad effusionem vel empyema digitalis. An hydrargyri preparationes cum opii pauxillo ad salivæ fluxum lenem ciendum?

CAP. XII. PERIPNEUMONIA  
NOTHA.

SYMPTOMATA.

Adsunt frigus, calorque alternatim ; lassitudo, tussis humida, muci viscidi, opaci expectoratio, dolores obtusi seu potius ponderis et angustiae sensus in aliqua thoracis parte, capitis dolor immanis nonnunquam vomitus ; dyspnœa ; vultus rubescentia, vertigo vel somnolentia ; pyrexia plerumque nulla vel mitis.

CAUSAE.

Anni tempus ver et autumnus ; ætas senilis ; subitæ cœli mutationes ; catarrhi priores.

DIAGNOSIS.

A pneumonia cognoscitur pyrexia miti  
vel

vel omnino absente ; dolore, calore, siti-  
que minus violentis : ab asthmate dig-  
noscitur, dyspnœa minus vehemente et  
eâ non per intervalla subeunte.

## PROGNOSIS.

Pyrexia vehemens subito invadens max-  
imo periculo stipatur.

## CURA.

Venæ sectio plerumque obest, ni dysp-  
nœa et angustiae sensus urgeant ; eme-  
tica tali quantitate data ut nausea move-  
atur ; epispastica invicem excipientia  
thoraci adinota ; laxantia lenia et ene-  
mata ; diluentia ; expectorantia ; bal-  
neum tepidum ; digitalis ?

Carditis, pulsu intermittente, syncope  
et palpitatione cognoscitur. Diaphrag-  
mitis, dolore circa costas inferiores, cin-  
guli

guli instar ventrem supra lumbos ambiente, respiratione maxime difficili, quiescente abdomine, solo thorace peractâ, delirio perpetuo, et risu sardonico, stipatur.

Peritonitis stipatur pyrexia ; dolore abdominis corpore erecto aucto, absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis. Hi morbi eandem medendi rationem postulant quæ pneumoniæ est idonea.



### CAP. XIII. GASTRITIS.

#### SYMPTOMATA.

Dolor ardens, fixus, pungens in ipso stomachi loco ; ejus exacerbatio in ipso puncto, quo aliquid ei ingeritur, vomitus dolentissimus statim ab omni ingesto,



to, singultus dolorificus, anxietas summa et perpetua circa præcordia, summa virium prostratio, pulsus durus et parvus, sitis magna, febris acuta continua : est ubi urina supprimitur.

## CAUSAE.

Aquæ frigidæ ingurgitatio corpore calefacto ; vis externa ; acria ingesta ; nimia ejus distentio ; exanthemata retro-pulsa.

## DIAGNOSIS.

Signa pathognomica sunt epigastrii dolor ardens et tumor ; vomitus crucians et eructatio ; magna virium prostratio ; singultus.

## PROGNOSIS.

Si dolor gradatim remittit et pulsus magis plenus et mollis evadit, resolutio est  
expec-

expectanda; minuitur suppuratio si symptomata per hebdomadam persistere etiamsi mitiora cum rigoribus et doloris remissione, anxietate, sensuque gravativo manente; si, remediis valentissimis in auxilium vocatis, pyrexia, dolor atque calor ingravescant, gangræna est timenda, et gangrænæ inceptæ signa, sunt doloris et caloris subita cessatio, regionis epigastricæ flacciditas; pulsus vix numerandus et intermittens; debilitas aucta; delirium.

## CURA.

Missio larga, et repetita sanguinis (non nos deterrere pulsus parvus debet) postea hirudines, cucurbitulæ cruentæ et vesicatoria parti affectæ sunt admoventæ; abdominis fomenta; pediluvia; enemata laxantia et emollientia; diluentia blanda parvâ copiâ; dolore et vomitu

mitu per intervalla solummodo redeuntibus, opiata.

Inflammatiō Erysipelatosa signis sequentibus stipatur; caloris, dolorisque sensus in ventriculi regione; vomitus; anxietas; anorexia; pyrexia mitis; nonnunquam in faucibus apparet eruptio erysipelatosa quæ sæpe per totum canalem alimentarium est diffusa; eodem tempore omnibus ingestis acribus ventriculo inusitata est sensilitas; diluentia blanda et tepida solummodo postulantur ni altera gastritidis species minuetur: si morbos putridos comitentur, acida, antiseptica, tonica sunt usurpanda: an, omnibus incassum tentatis, balneo frigido, immersio?

## CAP. XIV. ENTERITIS.

## SYMPTOMATA.

Dolor abdominis acutus, fixus, urens, tactû auctus; tensio perquam molesta præcipue circaumbilicum; nausea; vomitus; sitis magna; alvus pertinaciter astricta; febris acuta; pulsus frequens, durus et contractus; urina valde rubra; nonnunquam singultus.

## CAUSAE.

Easdem agnoscit causas ac gastritis; hernia incarcerata; volvulus; colica; frigus abdomini applicatum.

## DIAGNOSIS.

Ab hepatitide dignoscitur doloris absentia ad summum humeri jaculantis: ab gastritide dolore torquente et urente  
circa

circa umbilicum: ab colica, pyrexia et pulsu.

## PROGNOSIS.

Signa fausta sunt, dolores migrantes, ensimque cessantes; venter ad tactum minus dolens; alvus clysmatibus respondens; sudores calidi atque profusi; pulsus plenus et mollis; urinæ turbatae copiosa demissio. Infausta, sunt, ventris tormina sæva; abdomen tensum, tactumque refugiens: alvus pertinaciter clausa; urinæ suppressio; livor circum labia; singultus perpetuus; delirium; subsultus tendinum; convulsiones.

## CURA.

anguinis missio generalis et topica; laxantia; enemata emollientia; refrigerantia

gerantia; abdominis fomenta; semicupium; vesicatoria; diluentia blanda: an opiata per anum injecta? an balneum frigidum, rebus ad extremum redactis?



## CAP. XV. HEPATITIS.

### SYMPTOMATA.

Pyrexia; hypochondrii dextri ardor, tensio, dolor, sæpe pungens pleuritici instar sæpius obtusus et hypochondrii sinistro presso auctus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in latus sinistrum difficilis; spirandi difficultas sub inspiratione aucta; tussis fere sicca; anxietas; nausea; vomitus biliosus; alvus plerumqué astricta; urina parca, ruberrima; color faciei, oculorumque

lorumque subflavus; pulsus frequens, fortis et durus; singultus: Quando afficitur superficies convexa, dolor magis est lancinans; tensio major percipitur; tumor sæpe observatur; dyspnœa, singultuque magis violentis: Quando pars concava afficitur; dolor minus pungens est; respiratio magis libera; sed anxietas, nausea et vomitus magis premunt.

## CAUSAE.

Omnes inflammationem producentes; tubercula schirrosa; hepatis adhæSIONES; vis externa; concretiones biliariæ in ductibus biliariis et vesica fellea; affectus animum subito deprimentes; regiones calidæ.

## DIAGNOSIS.

Ab pneumonia dignoscitur, dolore minus

acuto et eo ad claviculam et summum humeri dextri ascendente; dolore pressu aucto; decubitu in latus sinistrum difficili; bilis vomitu; tussi, dyspnœaque minus violentis: ab splenitide tumoris et doloris situ: ab enteritide doloris torquentis circa umbilicum absentîâ.

#### PROGNOSIS.

Periculum secundum suppurationi vel gangrænæ proclivitatem dijudicabitur, quarum appropinquatio signis antea recensitis cognoscetur; hæmorrhagiæ naribus vel venis hæmorrhoidalibus; sudores copiosi vel diarrhœa biliosa sæpe morbum fauste solvunt.

#### CURA.

Sanguinis missio generalis et topica; epispastica parti affectæ; cathartica mita



tia et enemata; fomenta; diluentia; refrigerantia; antimonium tartarissatum portiunculis ad nauseam ciendum; regimen antiphlogisticum: morbo in supurationem exeunte, abscessus, si exteriora versus protrudat, cataplasmata et fomenta sunt utenda. In India Orientali curatur acido nitrico, vel hydrargyro interne et externe adhibito, donec excitatur salivatio.



## CAP. XVI. HEPATITIS CHRONICA.

### CHARACTER.

Hæc sæpe nulla quibus dignoscatur signa præbet, aliquando tamen eandem adesse suspicari potest, ex hepatitidis causis quibusdam prægressis, ex sensu quodam plenitudinis et gravitatis in  
hypo-

hypochondrio dextro, ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis, ex dolore quodam a presso hypochondrio dextro vel a decubitu in latus sinistrum sentito, et denique ex pyrexia leviori cum dictis signis subinde infestante.

## CURA.

Hydrargyrus interne et externe est administrandus donec excitatur lenis salivatio, tonicis et amaris conjunctis præcipue cinchona et ferri præparationibus. An acidum nitricum vel nitrosum?

## CAP. XVII. SPLENITIS.

## CHARACTER.

Pyrexia; hypochondrii sinistri, tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

Facile dignoscetur ab ullo alio morbo signis supradictis, et curatur modis sub hepatitide memoratis.



## CAP. XVIII. NEHPRITIS.

## SYMPTOMATA.

Pyrexia; dolor acutus, pungens sæpius obtusus in regione renis, sæpe ureteris iter sequens; mictio frequens urinæ vel tenuis decoloris, vel ruberrimæ; vomitus bilis variæ; ructus assiduus; cruris stupor;

stupor; testiculi ejusdem lateris retractione aut dolor.

#### CAUSAE.

Hanc producunt omnes causæ generales inflammationis; diuretica acrimonia; vulnera et contusiones renum; equitatio diuturna et vehemens; fæces induratae colo; decubitus in dorsum diuturnus; podagra retrocedens vel atonica; calculi.

#### DIAGNOSIS.

Ab lumbagine dignoscitur mictione frequenti, dolore ureteris iter sequente, et nequaquam aucto truncum erigendo: ab nephritide calculosa, pyrexia dolorem comitante primo ab insultu.

## PROGNOSIS.

Dolores sensim cessantes; urina copiosa et crassa; sudor calidus per totum corpus diffusus; sanguinis fluxus ab vasis hæmorrhoidalibus faustum morbi eventum denunciant. Dolor in loco pulsans sternutamento auctus; pyrexia aucta; crebrum meiendi desiderium; dysuria; dolor subito cessans; singultus; delirium; infausta sunt signa.

## CURA.

Sanguinis missio generalis et localis; laxantia lenia et enemata repetita; demulcentia blanda; rubefacientia; fomenta; semicupium; regimen antiphlogisticum; diaphoretica lenia, e. g. antimonium tartarisatum et similia refracta dosi; pyrexia et dolore multum levatis opiata.

CAP.

## CAP. XIX. HYSTERITIS.

## SYMPTOMATA.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor et dolor; os uteri tactui dolens; stranguria; tenesmus; vomitus; alvus primó astricta, postea fusa.

## PROGNOSIS.

Magna virium prostratio; vultûs erubescencia; rigores frequentes et abdominis tumor, infausta sunt symptomata: diaphoresis lenis; lochiorum fluxus; abdomen minus tensum et lactis secretio, faustæ sunt notæ.

## CURA.

Sanguinis missio generalis et topica; abdominis fomenta; diaphoretica lenia, qualia,

qualia, ipecacuanha vel antimonium tartarizatum opio conjunctum; laxantia lenissima; diluentia blanda; diæta blanda et nutriens.



## CAP. XX. CYSTITIS.

### SYMPTOMATA.

Pyrexia; dolor assiduus, ardens, pungens in loco vesicæ; tumor; mictio frequens dolorifica vel ischuria; vomitus; tenesmus.

### CAUSAE.

Omnes inflammationem producentes; calculus; vicinorum inflammatio etc.

### CURA.

Medendi ratio eadem est in hac ut in nephritide; diluentibus parce haustis.

CAP.

## CAP. XXI. RHEUMATISMUS.

## SYMPTOMATA.

Pyrexia; dolores acuti, lancinantes circa articulos, musculorum tractum sequentes, frequentur inigrantes, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestantes; calore externo, motuve aucti; partis affectæ tumor, rubor et tensio; urina ruberrima; alvus constipata; pulsus frequens, plenus atque durus; sanguis detractus crustam coriaceam exhibens; nocte adventante ingravescunt omnia symptomata.

## CAUSAE.

Plethora; cœli subitæ mutationes; frigus corpori calefacto admotum: ver et autumnus. Causa proxima est membranarum



branarum et expansionum aponeuroticarum tendinum inflammatio.

## DIAGNOSIS.

Ab arthritide dignoscetur dolore musculorum tractum sequente et nulla ventriculi affectione antecedente.

## PROGNOSIS.

In genere fausté terminatur sudore copioso et universali; urinâ sedimentum lateritium deponente; diarrhœa; hæmorrhagia vel eruptione cutanea.

## CURA.

Regimen antiphlogisticum; missio sanguinis generalis et topica; cathartica mitia et enemata; refrigerantia præcipue sales medii; diluentia; diaphoretica, qualia, antimonium tartarisatum, refractâ

refractâ dosi, aqua ammoniæ acetatæ, et pulvis ipecacuanhæ compositus; rubefacientia et dolore fixo epispastica; venæsectio ne ultra justos limites est instituenda nam tardam efficiet convalescentiam. An digitalis? An cinchona præcipue si sub intermittentis typo compareat morbus?



## CAP. XXII. RHEUMATISMUS CHRONICUS.

### CHARACTER.

Post rheumatismum, nisum violentum vel subluxationem; dolores artuum vel musculorum, sub motu præsertim aucti, plus minusve fugaces, calore lecti vel alio externo levati; artus debiles, pallidi, rigidi, facile et sæpe frigescen-  
tes;

tes; pyrexia nulla; tumor plerumque nullus.

## CAUSAE.

Rheumatismus acutus prior et plurimæ causæ rheumatismum acutum producentes. Causa proxima est atonia, rigiditas et contractio fibrarum muscularium et vasorum extremorum.

## CURA.

Stimulantia interna, qualia, oleum terebinthinæ, gummi guaiacum, anthemis pyrethrum, raphanus rusticanus et sinapi; tonica præcipue cinchona; stimulantia externa; frictio; electricitas; exercitatio; balneum calidum; calor externus; rubefacientia; epispastica; diaphoretica ut pulvis ipecacuanhæ compositus; opium et calomelas, singulorum granum unum per decem vespas:

peras: hydrargyrus ad solummodo salivationem non excitandum.



### CAP. XXIII. PODAGRA.

#### SYMPTOMATA.

Morbus hæreditarius, oriens sine causa externa evidente, sed præeunte plerumque ventriculi affectione insolita; hora secunda post mediam noctem plerumque invadente cum pollicis pedis vel articuli dolore, quandoque veró calcanei aut tali, ossium luxationem referente, cum sensu quasi aquæ tantum non frigidæ parti affectæ affusæ; mox sequuntur rigor, horror et pyrexia, dolor autem intenditur (rigore atque horrore sensim recedentibus) donec tandem sub noctem sequentem ad apicem pervenerit; tunc gradatim cessat, et  
æger

æger leni madore perfusus somno concedit, a quo evigilans, partem affectam tumore et rubore occupatam cernit; per dies plures febris, dolorque die advesperascente redeunt, levantur autem sub galli cantu; appetitus prostratus, totius corporis sub vesperam rigor, gravitas et sensatio molesta paroxysmum comitantur. Recedentem paroxysmum excipit pedis affecti pruritus vix ferendus cum cuticulæ desquamatione; morbo jam discesso æger per longum tempus valetudine secundâ fru-  
itur.

## CAUSAE.

Causæ prædisponentes sunt; labes hæreditaria; plethora; vitæ acme, venus immodica: causæ occasionales sunt, usus cibi animalis et conditorum immodicus; vinum aliique liquores spirituosi nimis liberaliter adhibiti; studi-  
um

um nimium; vita sedentaria ignava; evacuationes suppressæ; caput magnum; vigilia diuturnior; exercitatio violenta præcipue ambulatio; frigus extremis inferioribus applicatum.

#### DIAGNOSIS.

Ab rheumatismo cognoscitur dolore minores articulos aggrediente et ibi manente; si quando transfertur ex uno pedis pollice, alterum aggreditur; partis laborantis tumore et rubore; ventriculi affectione antecedente.

#### PROGNOSIS.

Hoc malum raro periculum adfert, ni ventriculus, caput et partes vitæ inservientes afficiantur.

#### CURA.

Venæsectio generalis plerumque obest;  
parti

parti affectæ hirudines aliquando prodesse possunt, sed optima remedia sunt lanula et patientia, cibo animali et liquoribus omnigenis spirituosus abstinentia ni vitæ cursus vel atoniæ signaliter postulant: si tumor, rigorque post paroxysmum permaneant, strigilis assiduë est utenda. In intervallis, ab omnigenis liquoribus fermentatis abstinentia; exercitatio modica præcipue ambulatio vel equitatio; cathartica ex oleo e seminibus ricini, aloë, rhabarbaro, sulphure sublimato, sapone et similibus, parata, ad alvum astrictam præveniendum: tonica, qualia, cinchona, quassia et ferri præparationes et sales alkalini: symptomatum violentiâ imminutâ, opiata. An florente ætate, viribusque minime labefactis, prima morbi accessione, sanguinis missio,

sio, laxantia lenia, emetica et partis affectæ auræ frigidæ expositio?



## CAP. XXIV. PODAGRA ATONICA.

### SYMPTOMATA.

Podagra atonica, cum ventriculi vel alius partis internæ atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia vel aliis atoniæ symptomatibus, subito sæpe alternantibus; alvo modo astrictâ, modo solutâ cum doloribus colicis; thoracis visceribus nonnunquam affectis, cordis palpitationem, syncopen et asthma producentibus: capite quoque affecto, cephalalgia, vertigo, apoplectici et paralytici affectus producuntur.

CURA.



## CURA.

Evitatio studiosa causarum omnium quæ corpus debilitant; exercitatio modica; balneum frigidum si corpus sub ejus usu potenter stimuleter; cibi animalis, vini minime acescentis vel spiritus ardentis aquâ commisti modicus usus; tonica et cathartica modo memorata sunt utenda. Dyspepsiæ signa emeticis mitissimis sunt sublevanda: fontânellas inseri et frigus evitari opus est.

CAP. XXV. PODAGRA RETRO-  
CEDENS.

## SYMPTOMATA.

Inflammatiō ad articulos more solito se prodit, sed ad doloris eundem gradum

dum non ascendit nec tempus assuetum perstat nec sensim decedit, sed repente cessat, excipiente partis internæ cujusdam affectu molesto : inter partes internas nulla frequentius afficitur quam ventriculus, unde anxietas, ægritudo magna, vomitus aut dolor vehemens, frigorisque sensus oriuntur : cor nonnunquam afficitur, unde syncope : interdum pulmones, unde asthma : quandoque caput, unde apoplexia vel paralysis.

## CURA.

Si ventriculum afficiat, protinus succurrendum est vino generoso liberaliter dato et aromatibus calefacto ; si non satis valida sint, spiritus ardentes, æther, spiritus ammoniæ succinatus et similia sunt usurpari : ubi morbi impetus non valde vehemens est, tinctura  
asæfœ-

asæfoetidæ, alkali volatile; moschus; confectio opiata etc: si comitetur vomitus sub initio vino calido primum aquâ commisto dein mero promovendus est, postea opiata: si comitetur diarrhœa jusculum tenue, postea opiata: si pulmones occupet, opiata, antispasmodica, epispastica: quando caput impetit, remedia verisimillima sunt epispastica, kali purum collo admotum foret vel capiti, extremisque partibus, et crurum cum sinapeos pulvere frictio; eodem tempore aromata, alkali volatile et similia dari possunt.



## CAP. XXVI. PODAGRA ABER- RANS.


### CHARACTER.

Partis internæ inflammatio, vel non  
D prægressa

prægressa vel prægressa et subito recedens artuum inflammatio.

CURA.

In tali casu oportet morbum venæsectione, cæterisque remediis, quæ idiopathicæ ejusdem partis inflammationi conveniunt, tractari.



ORDO III. EXANTHEMATA.

CHARACTER.

Morbi contagiosi, semel plerumque tantum in decursu vitæ aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, sæpe plures, exiguæ per cutem sparsæ.

CAP.

## CAP. I. VARIOLÆ BENIGNÆ.

## SYMPTOMATA.

Circa meridiem rigore, horrore atque  
anguore invadunt, quos excipiunt calor,  
dolor capitis dorsi et epigastrii (præci-  
ue digito premente) nausea, vomitus  
et somnolentia; adveniente eruptione  
infantes nonnunquam convulsionibus  
afficiuntur; tertio plerumque die pus-  
ulæ quædam discretæ erumpunt primo  
in facie et serie in totum corpus; symp-  
tomata tunc levantur, et quinto die,  
ruptione finitâ, cessant omnino; pus-  
ulæ indies conicæ crescunt, primo sub  
albidæ tunc flavæ evadunt, interstitia  
alde rubescunt: intumescit facies et  
culi nonnunquam clauduntur, circa  
diem undecimum magnitudinem sum-  
mam attingunt et in crustas abeunt:

faciei tumor subsidet, manus, pedesque exinde tumescunt. Quando pustulæ non admodum paucæ sunt, deglutiendi difficultas, raucedo et salivatio circa diem sextum vel septimum superveniunt, et febris decimo plerumque die iterum apparet; sed hæc omnia symptomata, cum faciei tumor subsidet et pustulæ arescunt, abeunt omnino.

#### CAUSA.

Contagium specificum.

#### DIAGNOSIS.

Dolor epigastrio presso et alia signa variolas ab aliis morbis dignoscent et præcipue si epidemicæ regnent.

#### CURA.

Regimen antiphlogisticum stricte esse adhibendum

adhibendum præcipue aër frigidus et purus libere est admissu; cathartica mercurialia ante diem quintum sunt administranda; aqua frigida et diluentia refrigerantia acidis grate reddita libere: crurum fatus: si urgeat diathesis phlogistica venæsectio et postea vomitorium: si accedant convulsiones, opiata: si eruptione finitâ urgeat pyrexia, cathartica lenia et antimonii præparationes ad nauseam movendum uti sunt: si fauces multum tumidæ sint epispastica collo et gargarismata; si magna sit debilitas cinchona, vinum: post diem quintum opiata semel vel bis indies summo cum fructu sunt administrata.

## CAP. II. VARIOLÆ MALIGNÆ.

## SYMPTOMATA.

In his pyrexia vehemens, vomitusque plerumque perpetuus ante eruptionem urgent, pulsus frequens, debilis, contractus et convulsiones nonnunquam violentæ comitantur; diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, et ad diem unum alterumve post illam protrahitur; die plerumque secundo pustulæ numerosæ, circumscriptione parum regulares, pallidæ, minime elevatæ et in vesiculas coëuntes sese ostendunt; symptomata post eruptionem præter vomitum omnia manent, in morbi progressu ingravescent symptomata febrilia et delirium vel coma supervenit; facies immodice tumet, deglutiendi difficultas, faucium molestia et salivatio maxime urgent;



urgent; in infantibus diarrhœa salivationis vicem præstat; pustulæ in maturationem tendentes, plenæ fiunt et flaccidæ, quarum acumina sæpe cavantur, punctaque nigra videntur; in suppurationem veram nunquam procedunt sed humorem effundunt et in crustas fuscas vel nigras abeunt, foveolis in cute relictis; erysipelas eruptionem sæpe præcedit vel comitatur: in morbo violento petechiæ, urina sanguine tincta et hæmorrhagiæ frequenter videntur.

## PROGNOSIS.

Dolor lateris vel ventriculi acutus post eruptionem; tumor faciei repente desidens; pustulæ valde confluentes super faciem et thoracem; deglutiendi vel spirandi maxima difficultas; delirium; petechiæ; magna virium prostratio; hæmorr-

hæmorrhagiæ et alia putredinis signa, infaustæ sunt notæ.

#### CURA.

Vires cinchona, vino, opio, acidis mineralibus, cardiacis et diæta nutriente sunt sustentandæ, et epispastica aliaque remedia typho idonea, libere sunt adhibenda: an, ante pustularum eruptionem, si cutis sit præter naturam calida, cum aliis morbi violenti symptomatibus, aquæ frigidæ corpori nudato affusio? an emetica si minitetur strangulatio?



### CAP. III. VARICELLA.

#### CHARACTER.

Pustulæ post brevem febriculam erumpentes,

pentes, in pustulas variolæ similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nullâ cicatrice plerumque relictâ, desinentes.

#### DIAGNOSIS.

Ab variolis dignoscitur pyrexia miti, eruptione primò in tergum comparente, et quarto vel quinto die in squamulas abeunte.

#### CURA.

Hic morbus periculi expers, raro medentis opera indiget; desquamatione finitâ catharsis lenis est propinanda.

## CAP. IV. RUBEOLA.

## SYMPTOMATA.

Hunc morbum antecedunt pyrexia, rigor, calorque alterni; anorexia, nausea, vomitus sæpe diarrhœa; ab initio tussis plerumque sicca, rauco, dyspnœa, sternutatio, capitis, oculorum gravedo, somnolentia continua, stillicidium humoris acris ex oculis cum tumore, ardore et rubore palpebrarum et coryza comitantur; eruptionem protinus præcedunt anxietas; præcordiorum oppressio et pruritus faciei molestus; quarto plerumque die primum in facie, papulæ exiguæ, rubræ, morsus pulicum red dentes, gradatim coëuntes vix supra cutem eminentes, comparent, et in corpus totum sese serie diffundunt; post sex dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes. Signa (præter vomitionem)

eruptione

eruptione ad finem perducta non levantur, sed per totum morbi cursum manent et desquamatione inclinâtâ, ingravescent pyrexia, dyspnœa, tussis, somnolentia aliaque symptomata, et urget plerumque diarrhœa.

## CAUSA.

Contagium specificum.

## DIAGNOSIS.

Sternutatio ; coryza ; humoris ex oculis stillicidium ; tussis et dyspnœa hunc morbum ab omni alio dignoscent.

## PROGNOSIS.

Signa fausta sunt pyrexia, dyspnœaque mites ; eruptio maturé apparens, diarrhœa lenis ; diaphoresis modica ; expectoratio libera atque copiosa. Infausta, sunt, vomitus post eruptionem perseverans ;

severans; pneumonia diarrhœa symptomatica stipata; lassitudo magna; dolores graves, fixi, eruptionem antecedentes; dolor capitis et oculorum permanens; petechiæ; papulæ subitò retrocedentes, præsertim si hisce succedat pneumonia, cynanche vel delirium.

#### CURA.

Sanguinis missio generalis et localis, secundum pyrexiaë, tussis et dyspnœæ violentiam, sed raro ante desquamationem postulatur; cathartica, qualia, soda phosphorata, tartari crystalli, senna, tamarindi etc: enemata laxantia; diaphoretica lenia, e. g. antimonium tartarisatum tali dose ut nauseam moveat; sales medii; diluentia tepida; demulcentia blanda; expectorantia mitia; pediluvia; epispastica lateri et inter scapulas; si non urgeat diathesis phlogistica,

phlogistica, opiata: morbo finito cathartica repetita: si superveniant pneumoniæ signa, venæsectio aliaque remedia ei aptata: si vexet diarrhœa sanguinis missio: si putredinis signa sese ostendant cinchona, vinum, confectio aromatica etc. libere sunt propinanda.



## CAP. V. SCARLATINA.

### SYMPTOMATA.

Ineunte hieme plerumque se ostendit, cum frigore febrili et aliis synochæ signis, quarto morbi die facies aliquantum tumet; simul in cute passim comparet rubor floridus, maculis amplis tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein sæpe anasarca, cito plerumque cedente.

CURA.

## CURA.

Regimen antiphlogisticum, frigore et calore ex æquo evitatis : desquamatione absolutâ alvi purgatio ; si in infantibus superveniant convulsiones vel coma, epispastica, opiata.



## CAP. VI. SCARLATINA ANGINOSA.

## SYMPTOMATA.

Lassitudo inusitata, animi dejectio, cephalalgia; gutturis angustia; musculorum cervicis rigiditas; horror; rigor, aliaque pyrexiaë signa sese ostendunt; secundo die deglutiendi difficultas, anorexia, nausea sæpe vomitus superveniunt; respiratio fit crebra, suspiriis interrupta; anhelitus est calidus atque urens



urens; cutis arida, calida, pungens et inquietudo magna vexant; pulsus frequens, parvus, debilis; alvus nec astricta nec soluta; tonsillæ tument, rubent et nonnunquam crustis albidis obducuntur; tertio plerumque die, rubor floridus pressu evanescens, sed cito rediens in corpus totum comparet; cutis lævis est et tumida; nonnunquam maculæ latæ, lividæ, paucæ circa pectus sese ostendunt; post tres dies cutis desquamatio plerumque accedit, superveniente dein sæpe anasarcâ.

## CAUSA.

Contagium.

## DIAGNOSIS.

Ab morbillis distinguitur, tussis, coryzæ, epiphoræ et sternutationis absentia :  
ab

ab variolis dolore epigastrio presso absente.

#### PROGNOSIS.

Delirium; oculi inflammati et splendidi; efflorescentia cito apparens; diarrhœa; infausta sunt symptomata.

#### CURA.

Obest plerumque sanguinis missio; emetica repetita summo cum fructu utuntur; cardiaca, e. g. contrayerva, mistura camphorata etc; diuretica ut kali pp. ammonia præparata: gargarismata: diaphoretica præcipue antimonium tartarisatum refractâ dosi ad nauseam movendum; pediluvia; balneum tepidum; regimen antiphlogisticum; postea cinchona, ferri præparationes: si permanserit debilitas cum comate, epispastica: ad anasarcam, scilla, calomelas, sales alkalini

alkalini, digitalis ; et eâ affectione amotâ, tonica, ut cinchona, vinum, ferri præparationes, diæta nutriens et exercitatio : an aquæ frigidæ corpori nudato affusio ? An acida mineralia et vegetabilia diaphoresi leni primo excitata ?



## CAP. VII. PESTIS.

### SYMPTOMATA.

Eodem plerumque modo quo typhus gravior incipit ; frigoris paroxysmi gravius ægrum adoriuntur quam in febre continuâ contingit ; ingens partium internarum excipit calor ; æger torpedine quadam, mentis stupore, aurium tinnitu, capitis gravedine, ebrii instar, afficitur : vultus horrore plenus, oculi rubri, vagi atque prominentes, capitis dolor immanis, vigiliæ, delirium et interdum

terdum coma comitantur; ingens supervenit virium prostratio, animi dejectio et sollicitudo; præcordia oppressa, respiratio difficilis, nausea perpetua atque vomitus biliosus, dejectiones biliosæ, foetidæ, miserum torquent: pulsus frequens, debilis, abnormis sæpe tamen magis durus et plenus evadit; sitis immodica est; lingua plerumque albida, haud raro nigra; urina pallida et cruda vel rubra et turbida; aut citius aut serius bubones, (partis pruritu præcedente) vibices, carbunculi atque petechiæ comparent et æger syncope, tendinum subsultu et convulsionibus tentatur.

## CAUSA.

Contagium.

## PROGNOSIS.

## PROGNOSIS.

Signa fausta sunt, ægri vires haud multum depressæ; lenis et universus sudor cum pulsu valido et regulari, anxietatem, nauseam et vomitum tollens; bubonum et carbunculorum eruptio morbi levamine comitata: Infausta sunt; calor immodice intensus; sudores profusi corpus debilitantes; petechiæ nigræ, latæ cito conspicuæ; magna et subita virium prostratio.

## CURA.

Venæ sectio caute est celebranda; vomitoria, ad vomitionem semel et postea nauseam ciendum; diluentia; refrigerantia; regimen antiphlogisticum; mundities summa et cubiculi perpetua ventilatio; cinchona, vinum et alia typho graviori idonea; aqua frigida libere est bibenda:

bibenda : corporis totius cum oleo olivæ  
frictio : an aquæ frigidæ affusio ? an hy-  
drargyri præparationes ad salivæ fluxum  
lenem ciendum ?



## CAP. VIII. ERYSIPELAS.

### SYMPTOMATA.

Pyrexia, somnolentiâ, delirio vel comate,  
stipata; pulsus frequens, plenus est et  
durus; secundo, tertiove die comparet  
eruptio coloris rubicundi, pressione eva-  
nescens, ambitûs inæqualis, serpens,  
faciem, collumque operiens; tumor evi-  
dens, palpebras nonnunquam occludens,  
dolor urens, in cuticulæ squamulas,  
phlyctænas vel vesiculas abiens; faciei  
inflammatione apparente pyrexia non  
semper remissionem patitur sed sæpe  
cum inflammatione ingravescit et dies  
octo

octo vel decem durat; palpebræ nonnunquam in suppurationem tendunt; comate et delirio in gravescentibus, æger die septimo, nono vel undecimo mortalitatem explet,

## CAUSA.

Sensilitas et irritabilitas auctæ; frigus; acria aliena applicata; evacuationes solitæ suppressæ; erysipelatis priores insultus.

## DIAGNOSIS.

Ab scarlatinâ anginosâ, faucium tonsillarumque dolore, rubore et tumore dignoscitur.

## PROGNOSIS.

Pyrexia vehemens; coma vel delirium perpetuum infausta sunt signa; sine crisi evidente faustè terminatur morbus.

## CURA.

## CURA.

Sanguinis missio si adsit diathesis phlogistica; emetica, ad vomitionem, nauseamque ciendum; regimen antiphlogisticum; diluentia; applicationes topicae, e. g. avenacea farina; amyllum; folia brassicae etc: si delirium vel stupor urgeat, capiti fomenta et epispastica: si putredinis sit symptoma, vinum; opium; cinchona: caput erecte est tenendum: an moschus et ammoniac præparata largis dosibus si timenda sit gangræna? an cinchona larga dosi omni in morbi stadio?



## CAP. IX. MILIARIA.

## SYMPTOMATA.

Synochus: dolor plerumque pectoris;  
anxietas



anxietas; suspiratio frequens; sudor olidus; punctiones cutis; incerto morbi die erumpunt papulæ rubræ, exiguæ, milii seminis magnitudine per totam cutem, præter faciem, crebræ; quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, in squamulas abeuntes, ostendunt.

## CAUSAE.

Debilitas; regimen calidum; puerperium.

## DIAGNOSIS.

Ab omnibus aliis exanthematibus sudore olido dignoscetur.

## PROGNOSIS.

Petechiæ inter papulas erumpentes; magna debilitas vel putredinis signa; eruptio

eruptio retrocedens, delirio vel comate superveniente infausta sunt signa.

#### CURA.

Regimen antiphlogisticum præcipue aëris frigidi libera admissio ; si debilitas, coma vel putredinis signa concomitantur, cinchona, vinum, opium et epispastica ; si adsit diathesis phlogistica venæsectio etc.



### CAP. X. URTICARIA.


#### CHARACTER.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdum fere, evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas abeuntes.

#### CURA.

## CURA.

Regimen antiphlogisticum, medicamentis vix unquam indiget; post desquamationem alvi lenis purgatio.



## CAP. XI. PEMPHIGUS.

## SYMPTOMATA.

Pyrexia; primo, secundo, tertiove morbi die, in variis partibus internis et externis pruritu præcedente, erumpunt vesiculæ, humore subflavo plenæ, avelanæ magnitudine, tres quatuorve dies manentes, et tandem ichorem tenuem effundentes.

## CŪRA.

Primæ viæ vomitorio et alvi purgatione sunt evacuandæ; postea tonica; cardiaca; antiseptica; gargarismata.

## CAP. XII. APHTHÆ.

## CHARACTER.

Lingua tumidiuscula; linguæ et faucium color purpurascens; escharæ in faucibus et ad linguæ margines primum comparentes, os internum totum, nonnunquam etiam canalem alimentarium occupantes, albidæ, aliquando discretæ, sæpe coalescentes, abrasæ cito renascentes, et incerto tempore manentes, pyrexia plerumque mitis.

## CURA.

Absorbentia; laxantia mitia; emetica lenia nonnunquam prosunt; applicationes topicæ, quales, boracis scrupuli duo aut drachma ad mellis unciam, cujus pauxillum penicillo frequenter  
est

est utendum: morbo ingravescente, cardiaca; cinchona; opiata; epispastica.



## ORDO IV. HÆMORRHAGIÆ.

### CHARACTER.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet.



## CAP. I. HÆMORRHAGIA.

### SYMPTOMATA.

Plura vel pauciora e signis sequentibus sæpissime sanguinis profluvium antecedunt, plenitudo, tensio, ardor vel gravitas partis ipsius vel ejus vicinæ, fri-

goris sensus modo levis, modo gravis accedit, eum concomitantur plus minusve horroris et rigoris, nonnunquam nausea et vomitus; hæc signa sensim decedunt et calor præter naturam auctus excipit, pulsus fit frequens, citatus, plenus, validus atque durus et sanguis prorumpit; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet.

## CAUSAE.

Plethora universa; evacuationes solitæ imminutæ vel suppressæ; conformatio partium prava; animi pathemeta violenta; calor externus; exercitatio violenta; ligaturæ; omnia quæ circuitionem sanguinis accelerant; frigus externe admotum.

## CURA.

## CURA.

Regimen antiphlogisticum stricte est administrandum, calor externus præcipue est evitandus; refrigerantia præcipue acida, nitrum et infusum rosæ; potus frigidi; sanguinis missio; emetica; epispastica; astringentia præcipue alumen, catechu, frigus externum: si diathesis phlogistica fuerit sublata, opiata: Reditus ejus, diæta parcior minusque nutriente, exercitatione modica præcipue gestatione, equitatione, navigatione, alvi leni purgatione, caloris externi et causarum remotarum evitatione, æquanimirate, est præcavendus.

## CAP. II. EPISTAXIS.

## CHARACTER.

Capitis dolor vel gravitas, faciei rubor, narium pruritus, sanguinis profusio e naribus.

## CURA.

Quando non crisin indicat, est cohibenda corporis, capitisque situ erecto, narium pressione, capitis immersione in aqua frigida sale muriatico in eâ soluto; lintheolis polline vel alumine sparsis et in nares ingestis; irritationis omnis evitatione: redivitui ejus occurritur fontanellis et modis modo memoratis.

CAP.



## CAP. III. HÆMOPTYSIS.

## CHARACTER.

(Genarum rubor; molestiæ aut doloris, et aliquando caloris in pectore, præcipue sub sterno sensus; in ore salis sapor; dyspnœa; faucium titillatio, nonnunquam nausea et vomitus; tussis aut tussicula sanguinem floridum, sæpe spumosum rejiciens.

## CAUSAE.

(Causæ prædisponentes sunt, certa ætas, nempe inter decimum sextum et trigesimum quintum annum; temperamentum sanguineum; sensibilitas nimia; excretionum consuetarum suppressio; hæmorrhagiæ priores; labes hæreditaria, quæ, collo longo, procerâ staturâ, thorace plano et angusto, scapulis depressis,

pressis, notatur et omnes causæ remotæ hæmorrhagiæ.

#### DIAGNOSIS.

Sanguinis profluvium ab faucibus tussi nullâ comitatur : hæmatemesis, vomitu sanguinis nigri, alimentis commisti, dignoscetur, tussi nullâ comitante.


#### PROGNOSIS.

Prognosis magis fausta, si hæmoptysi cessante, nullus thoracis dolor, dyspnœa vel tussis permaneat : vel si, ab evacuatione suppressâ vel vi externâ sine causis prædisponentibus oriatur.

#### CURA.

Regimen antiphlogisticum sedulò est usurpandum ; venæsectio secundum symptomatum violentiam repetita ; cathartica

thartica refrigerantia; epispastica; vomitoria lenia; cochleare natri muriati; astringentia; corporis, mentisque quies et alia pro hæmorrhagiis modo memorata: an postea, cinchona, acidum vitriolicum et opium? an corporis, usque ad pubes aquâ frigidâ, immersio?



#### CAP. IV. PHTHISIS.

##### SYMPTOMATA.

Plura vel pauciora signa modò memoranda phthisin sæpe antecedunt; pyrexia lenis exercitatione minimâ aucta; manuum volæ ardentes et inadoris expertes præsertim die advesperascente; oculi post somnum humidi; urina aucta; cutis arida pedum præcipue aurorâ adventante; genarum erubescencia;

scentia; raucedo; dolor pectoris levis vel acutus; dolor lateris fixus vel dolor lateris utriusque lancinans; cephalalgia; animi deliquia crebra; appetitûs defectus; exercitationi vel motui inaptitudo universa; tunc symptomata morbum certum notantia superveniunt, nempe, tussis sicca plus minusve violenta levissimis causis exacerbata; raucedo; præcordiorum gravitas et constrictionis sensus præsertim post motum, in unum magis quam in alterum latus decumbendi difficultas et respiratio leviter molesta; pulsus ab initio frequens, plenus atque durus; respiratio multo citatior quam in salute evadit costiselevatis et sono suspirationem referente perficitur; tussis vespere adventante sensim ingravescit, per noctem ægrè vexat, et muci posteaque puris expectoratio accedit; hæc signa,  
lateris

lateris et thoracis doloribus erraticis, lassitudine et animi asperitate stipantur; cibi appetitus imminuitur, et vomitus sæpe post pastum obvenit: Jamque tabescit corpus, sputa copiosiora, purulenta, colore variantia, albentia, flaventia, viridentia nonnunquam sanguine striata cum sapore quasi materiæ putrescentis, rejiciuntur, et hectica justa supervenit, cujus exacerbationes, bis intra viginti quatuor horas, una obscurior meridie circiter, altera sub noctem, præeunte plerumque languoris, frigorisque sensu, accenduntur, hæ accessiones, per aliquot horas, calore et siti auctis, tussi magis molestâ et sputo minus libero, perstant, manè, sudores plus minusve profusi corpus magnopere infirmantes, erumpunt; urina sedimentum leve furfuraceum deponit, et omnia signa aliquid levaminis recipiunt,

recipiunt, cute solummodo arida manente: lingua, faucesque quasi leviter inflammatae rubent aut aphthis obducuntur; pallor cadaverosus totum vultum præter exiguum circumscriptum genarum spatium occupat; morbo procedente tunica adnata margaritarum colorem refert; diarrhœa colliquans cum sudoribus vices alternans, pedes œdematosi, capilli decedentes, ungues adunci, elata præcordia summam virium defectionem demonstrant, et mors anica scenam claudit.

## CAUSAE.

Causæ prædisponentes sunt, labes hæreditaria; conformatio thoracis prava; cervix longa; humeri elati; thorax angustus; temperamentum sanguineum; scrofula; sensibilitas nimia; rubeola;

rubeola ; eruptiones retropulsæ ; evacuationes immodicæ ; nimia sanguinis oxygenatio ; extranea in pulmones accepta : Causæ occasionales sunt, hæmoptysis, catarrhus, asthma, pneumonia, tubercula, contagium.

## PROGNOSIS.

In phthisi incipiente anceps est prognosis, ex febris hecticæ violentiâ, debilitate, sputi naturâ, aliisque signis plus minusve violentis eventûs judicium est trahendum.

## CURA.

Sanguinis missio secundum ægri vires in primo stadio ; diæta ex lacte vel vegetabilibus confecta ; emetica ex ipecacuanha et zinco vitriolato in omni morbi stadio ; regimen antiphlogisticum ;

cum ; epispastica ; setacea ; nitrum in dosi decem vel quindecim granorum ; ambulatio in aëre frigido et sicco : in stadio secundo diæta cardiaca foret et stimulans, præcipue ex lichene islandico, piscibus testaceis et similibus : digitalis ; exercitatio, præcipue navigatio, equitatio ; climatis mutatio ; locorum arctorum evitatio, etc. ætheris vitriolici et cicutæ vaporis inhalatio ; aëra arte facta : in stadio tertio balsama naturalia, acida mineralia, aqua mephitica vel seltzerana, opiata, et alia supra recensita : an cinchona ? An solutio muriatis calcis ?



## CAP. V. HÆMORRHOIS.

### SYMPTOMATA.

Capitis gravitas vel dolor, vertigo, nausea,  
sea,



sea, lumborum, anique dolor; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui, aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat, alvus plerumque astricta, pyrexia.

## CAUSAE.

Ætas provecta; plethora; alvi durities; cibus et potus immodice sumpti, arthritis; obstructio hepatica; prolapsus ani; usus purgantium immodicus; quæcunque reditum sanguinis venosi impediunt; recti relaxatio et ejus venarum torpor.

## CURA.

Si dolor sit immanis et partes multum tumefactæ, hirudines parti affectæ sunt admovendæ, et fomenta sunt utenda;  
alvus

alvus astricta laxantibus est amovenda quorum optima sunt, flores sulphuris, oleum e seminibus ricini, tartari crystalli, balsamum copaivæ, electuarium sennæ, et similia: astringentia externa, qualia, gallæ, cortex quercus, frigida lavatio: astringentia interna: si ab ani prolapsu ortum traheret, rectum quam primum in suum locum arte est restituendum, et redditui ejus occurrendum remediis causæ ejus idoneis: plethora modis sub hæmorrhagia memoratis est amovenda et causæ remotæ sunt evitandæ.



## CAP. VI. MENORRAHIA.

### SYMPTOMATA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruum copiosior

pior vel sanguinis e vagina præter ordinem fluxus, pyrexia, dyspnœa, capitisque dolore, comitatus, systema totum infirmans.

## CAUSAE.

Plethora, liquores spirituosos, victus lautior; exercitium nimium; ictus abdomini inferiori illati ejusve contusiones; nisus violenti; animi pathemata violenta; systematis laxitas et debilitas; venus immodica; abortus crebrior; partus difficilis; alvi durities; frigus pedibus admotum; theæ usus immoderatio: Causa proxima est, uteri vasorum aucta actio, eorum laxitas et ruptura.

## PROGNOSIS.

Copia sanguinis larga subito effusa; sudores frigidi et convulsiones magnum periculum imminet.

## CURA.

## CURA.

Si symptomata adsint phlogistica venæsectio; regimen antiphlogisticum præcipue corporis, mentisque quies, et caloris evitatio; diæta parca; laxantia lenissima; enemata; refrigerantia; lectus minus mollis foret et stragulis levioribus opertus; astringentia interna, ut cerussa acetata, alumen, kino, catechu, cinchona, infusum rosæ: externa, ut lintea aqua gelida et aceto vel quercus decocto forti madefacta, pudendis et dorso applicanda: sedativa astringentibus conjunctis; abdomini epispastica: In intervallis causæ remotæ sunt evitandæ et tonica, qualia cinchona, ferri præparationes, exercitatio modica et balneum frigidum sunt utenda.

CAP.

## CAP. VII. LEUCORRHŒA.

## SYMPTOMATA.

Materiei colore variantis e vagina, sine uteri topicâ affectione fluxus, coxis et dorso dolore continuo stipatus, menorrhagia conjunctus vel mox secutus, systema totum, præsertim ventriculi functiones debilitans; pyrexîâ, dyspnœâ, et palpebrarum tumore nonnunquam concomitantibus.

## CAUSAE.

Causæ sunt partus frequens sine infantis lactatione, partus difficiles; menorrhagia et omnes causæ eam producentes.

## CURA.

Astringentia qualia hæmatoxylum et alia supra recensita; injectiones astringentes

gentes in vaginam immissæ; stimulantia, ut, cantharides, terebinthina, balsamum copaivæ etc : tonica præcipue cinchona, ferri præparationes, zincum vitriolatum et balneum frigidum; rhabbari pauca grana cum opii grano uno omni nocte per plures menses; emplastrum pieis burgundicæ compositum lumbis admotum foret et indusium laneum induere convenit.



## CAP. VIII. AMENORRHŒA.

### SYMPTOMATA.

Dyspepsia; cibi desiderium aut inminuitur vel absurdum est; cutis pallor vel decoloratio; oculi subsedisse videntur et circulo livente circumdantur; labia rubedinem amabilem perdunt; venæ minus plenæ apparent; corporis  
tumor

tumor mollis ; asthenia ; respiratio citata præcipue post motum ; lumborum ; coxarum nonnunquam etiam capitis dolor ; palpitatio ; syncope ; menstruum retentio : Chlorosis Auctorum.

## CAUSAE.

Uteri vasorum actio infirmata ab systematis debilitate et laxitate orta.

## CURA.

Systematis tonus est restaurandus exercitatione omnigena ; balneo frigido ; tonicis, præcipue ferri præparationibus myrrha, kali præparato, et aromatibus conjunctis ; vasorum uteri excitanda est actio catharticis, nempe alöe, calomelane et similibus ; ambulatione ; saltatione, frictione, pediluviiis, fomentis tepidis regionis hypogastricæ ; ictu electrico,

trico, arteriæ iliacæ compressione, et præ omnibus nuptiis : an gas oxygenium dilutum?



## CAP. IX. SUPPRESSIO MENSIIUM.

### SYMPTOMATA.

Dorsi, lumborumque dolor ; dyspepsiæ et hysteriæ symptomata ; alvus astricta ; dolores colici ; hæmorrhagiæ ab variis corporis partibus.

### CAUSAE.

Uteri vasculorum extremorum spasmus sive rigiditas nimia ; atonia atque debilitas corporis universi.

### CURA.

Si adsit plethora, venæsectio, aliter non ; uteri vasorum constrictio est amovenda



venda balneo tepido, fomentis regioni pubis admotis; catharticis, opiatis, antispasmodicis; his nihil valentibus medicamenta et alia, ad speciem priorem aptata, sunt adhibenda: remedia hæcce plus auxilii adportabunt, si eo tempore, quo nisus hæmorrhagicus impendit, utantur: Ad dysmenorrhagiam opiata, pediluvia, balneum tepidum et diluentia tepida conducunt.



## CAP. X. HÆMATEMESIS.

### CHARACTER.

Sanguinis coloris nigri, grumosi, alimentis commisti ex ventriculo vomitu rejectio; nausea; doloris et gravitatis sensu præcedente.

### CAUSAE.

## CAUSAE.

Plethora; evacuationes sanguinis suppressæ; tumores splenem vel hepar comprimentes; vis externa.

## CURA.

Hic morbus plerumque symptomaticus est; si hæmorrhagia sit violenta, et plethora adsit, venæsectio et alia hæmorrhagiis idonea sunt usurpari: in genere astringentia et tonica, qualia cinchona, ferri præparationes et opium, conducunt: si ab evacuationibus suppressis oriatur, hæ sunt restaurandæ: si ab tumoribus splenem vel hepar comprimentibus, hydrargyrus, cicuta, etc.

## CAP. XI. HÆMATURIA.

## CHARACTER.

Plerumque morbus est symptomaticus, ab calculo renem lacerante, hæmorrhoidibus suppressis vel sanguine in putredinem vergente oriens.

## CURA.

Si ab calculo oriatur, enemata laxantia, regimen antiphlogisticum, demulcentia, et aqua super-carbonatis potassæ vel sodæ sunt utenda: si ab hæmorrhoidum suppressione remedia ei aptata sunt utenda: si ab putredine, antiseptica: Linteum in ægri urina immersum colore rubro tingetur.

## ORDO V. PROFLUVIA.

## CHARACTER.

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter non sanguinea.



## CAP. I. CATARRHUS.

## SYMPTOMATA.

Pyrexia sæpe contagiosa, capitis gravitas vel dolor, nares farctæ aëris aditum impediētes, muci ex glandulis membranæ narium, faucium vel bronchiarum excretio aucta; nonnunquam sternutatio et oculorum quasi distentio: lachrymarum fluxus, faucium rubedo, calor atque tumor; trachææ asperitas; rauco; angustiae in thorace sensus; dyspnœa; tussis molesta primo sicca postea mucum copiose ejiciens.

## CAUSAE.

## CAUSAE.

Causæ remotæ sunt frigus corpori admotum et nonnunquam contagium : Causa proxima est, humorum ad glandulas mucosas narium, faucium et bronchiarum affluxus auctus, statu inflammatorio stipatus.

## PROGNOSIS.

Catarrhus maxima ex parte periculi expers, sed in senibus peripneumoniam notham nonnunquam inducit et in prædispositis phthisin creare videtur.

## CURA.

Vix aliud plerumque requiritur, nisi, ab cibo animali abstinencia, diluentia blanda, tepida ; sin urgeat diathesis phlogistica, sanguinis missio, regimen antiphlogisticum, laxantia, demulcentia, dia-

P 2

phoretica .

phoretica ut pulvis ipecacuanhæ compositus vel antimonium tartarisatum ad nauseam solummodo movendum, expectorantia mitia et epispastica, uti sint: diathesi phlogisticâ imminutâ, opiata; oleum naso externo est admotu.



## CAP. II. DYSENTERIA.

### SYMPTOMATA.

Pyrexia contagiosa; nausea; vomitus, intestinorum inflatio, tormina graviora, dejectiones parvæ, frequentes, mucosæ, spumosæ, sebaceæ vel sanguinolentæ et fimbriis membranaceis admixtæ, retentis plerumque fæcibus alvinis, vel massulis stercoris indurati, (scybalâ appellatis) solummodo comparentibus, tenemus nonnunquam singultus.

CAUSA.

## CAUSA.

Causa remota specificum est contagium, et causa proxima esse videtur coli constrictio spasmodica.

## PROGNOSIS.

Tenesmus et tormina valde vehementes; dolor subito cessans cum pulsu debili et intermittente; fæces valde foetidæ; magna debilitas; petechiæ; singultus, infausta sunt signa: diaphoresis lenis; dejectiones minus frequentes et vires parum fractæ fausta sunt signa.

## CURA.

Venæsectio si urgeat diathesis phlogistica; emetica, et magis poterint si non tantum vomitum sed alvum quoque moverint; cathartica repetita, præsertim natron vitriolatum, oleum e seminibus ricini,

ricini, soda phosphorata, etc. et omni nocte post catharticum usum opiata et præ omnibus pulvis ipecacuanhæ compositus; enemata larga ex amylo vel lini seminibus parata; demulcentia mucilaginosæ; fomenta; semicupium; epispastica; diæta ex lacte et oryza: quando amoveatur diathesis phlogistica, tonus intestinorum tonicis, et astringentibus ut cinchona, simarouba, quassia, floribus chamæmeli, colomba, gentiana et similibus, est restaurandus: an, morbo inveterato, calomelas ad salivationem lenem ciendum? an extractum nucis vomicæ in dosi grani et dimidii tertiiis horis? Si sub intermittentis typo compareat febris, cinchona est administranda.



# NEUROSES.

---

## CLASSIS II. NEUROSES.

### CHARACTER.

Sensus et motus læsi sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

## ORDO I. COMATA.

### CHARACTER.

Motus voluntarii imminuti cum sopore sive sensuum feriatiōne.

## CAP. I. APOPLEXIA.

### CHARACTER.

**M**OTUS voluntarii fere omnes imminuti, cum sopore plus minusve profundo, stertore, faciei tumore et rubore, superstite motu cordis et arteriarum; præcedentibus

præcedentibus nonnunquam vertigine, capitis dolore, epistaxi, aurium tinnitu, incubo, caligine, vel stupore.

#### CAUSAE.

Causæ prædisponentes sunt ætas senilis; caput magnum, cervix brevis; obesitas immodica; vita sedentaria ignava; vinum aliique liquores spirituosi nimis liberaliter adhibiti; evacuationes solitæ suppressæ; studium nimium; Causæ occasionales sunt, exercitatio vehemens; pathemata animi violenta; calor externus; compressio colli externa; vis externa; inspiratio plena et longa; nimia vasorum cerebri distentio et eorum laceratio.

#### DIAGNOSIS.

Ab paralyysi, stertore, somno profundo et  
motuum

motuum omnium voluntariorum inminutione dijudicabitur apoplexia.

#### PROGNOSIS.

Prognosis fausta vel infausta pro accessionis gravitate dirigenda erit, nonnunquam fauste solvitur morbus hæmorrhagia vel diarrhœa.

#### CURA.

Sanguinis missio generalis nimis libera plerumque nocet, sed cucurbitulæ cruentæ occipiti admotæ maxime conducunt, capitis fomenta, ictus electrici lenes per cranium missi; cathartica acria ex colocynthide, alœe, extracto jalapii et similibus parata; enemata acria; vésicatoria capiti, spinæ dorsi et extremis: cataplasmata sinapeos; regimen anti-phlogisticum; capitis positura erecta: Ad  
reditum

reditum ejus præcavendum, causæ excitantes sunt evitandæ et diæta minus foret nutriens; liquoribus spirituosus abstinencia; exercitatio modica; medicamenta leniter alvum subducentia; setacea vel fontanellæ prope caput maxime conducunt; an errhina? an opium? an hydrargyri præparationes ad salivationem lenem ciendum?



## CAP. II. PARALYSIS.

### SYMPTOMATA.

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, sæpe cum sopore; pulsus tardus et mollis; alterutro corporis latere plerumque affecto, inde hemiplegia appellato; præeuntibus sæpissime torpore universali, vertigine, capitis gravedine, mentis

mentis hebetudine, oblivione insuetâ, aliorum sensu lateris vel partis passuræ et nonnunquam tremore et dolore.

## CAUSAE.

Cerebri compressio ab effusionibus sanguineis, serosis vel tumoribus; vis nervæ imminuta; venena in corpus accepta; colica pictonum; apoplexia et ætas protracta.

## DIAGNOSIS.

Ab apoplexia, aliisque morbis pulsû et symptomatibus facile dignoscetur.

## PROGNOSIS.

Partis laborantis calor, dolor levis punctionis seu formicationis sensus; pyrexia vel diarrhœa, faustæ sunt notæ.

## CURA.

## CURA.


Si ab cerebri compressione oriatur, venæ sectio et alia remedia apoplexiæ aptata sunt utenda; quando hemiplegia solummodo manet, utenda sunt stimulantia externa, ut, epispastica, rubefaciencia, e. g. tinctura cantharidis, linimentum ammoniæ, æther, etc. frictio; urticatio; electricitas et balneum frigidum: stimulantia interna, ut, anthemis pyrethrum, sinapi, raphanus rusticanus, arnica montana, sales volatiles et hydrargyrus; diæta nutriens foret et stimulans; postea aquæ bathonienses.

ORDO

## ORDO II. ADYNAMIÆ.

## CHARACTER.

Motus involuntarii, sive vitales, sive naturales imminuti.



## CAP. I. SYNCOPE.

## SYMPTOMATA.

Motus cordis imminutus vel aliquandiu quiescens, sine causa manifesta sæpe rediens, cum cordis palpitatione vehementi in intervallis, ex vitio cordis vel vasorum vicinorum, vel ex systematis totius affectione, oriens, nonnunquam vomitu, convulsionibus vel epilepsia terminatus.

## CAUSA.

## CAUSA.

Causa proxima esse videtur motus imminutus, vel, cordis et arteriarum, actio quiescens.

## CURA.

Stimulantia in paroxysmo ad nares sunt applicanda; postea tonica: si ab causa manifesta oriatur, remedia ei idonea sunt administranda.



## CAP. II. DYSPEPSIA.

## CHARACTER.

Anorexia, nausea, vomitus, ventriculi inflatio, ructus acidi, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, anxietas, languor, animus leniter depressus, pauciora saltem  
vel



vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo astricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium morbo.

## CAUSAE.


Causæ remotæ sunt duplices, 1. quæ in ventriculum ipsum protinus agunt: 2. quæ in alias corporis partes agunt et dein in ventriculum atoniam diffundunt. Hæ sunt speciei prioris, sedantia seu narcotica, qualia, opium, liquores spirituosus; nicotiana; thea et coffea; acida; aromata; cibus plenior; vomitio nimis crebra; amara; liquores calidi nimis profuse hausti; salivæ excretio nimia. Quæ in alias corporis partes primum agunt, ut, affectus animi violenti, vita sedentaria, studium intensius, venus nimia, tempestas humida et frigida

gida sine exercitatione; inebrietas: Causa proxima est atonia fibrarum ventriculi muscularium et debilitas.

## CURA.

Emetica; sales alkalini et absorbentia, præcipue aqua calcis, sapo: cathartica ex alöe, rhabarbaro vel senna, aromatibus vel amaris conjunctis; epispastica dorso; postea ad tonum ventriculi restaurandum, tonica, qualia, ferri præparationes, quassia, cinchona, colomba et gentiana; quædam symptomata sunt levanda, ventriculi inflatio levatur æthere vitriolico: cardialgia acido sulphurico, sapone, aqua seltzerana vel opio est amovenda: vomitus clysteribus opiatis: anxietas et oppressio post pastum aromatibus ut decem piperis nigri granis statim sumptis: diæta ex cibo animalis

animali foret confecta; exercitatio modica et balneum frigidum medelam accelerant: aquæ bathonicæ et aqua ex pice liquida parata conducunt; causæ occasionales sunt evitandæ.



### CAP. III. HYPOCHONDRIASIS.

#### CHARACTER.

Dyspepsia cum languore, mœstitia, metu præcipue mortis, morositate, zelytypia, pravisque suspicionibus omnigenis, ex causis non æquis in temperamento melancholico, alvo modo dura modo fusa.

#### DIAGNOSIS.

Hypochondriasis ab dyspepsia dignoscitur, languore, mortis metu, pravisque suspicionibus

suspicionibus semper præsentibus et signis dyspepsiæ minus violentis vel omnino absentibus; in dyspepsia, signa ejus affectionis majori semper adsunt gradu, et alia supra memorata minus sunt violenta vel omnino absentia; hypochondriasis nunquam in prima ætate occurrit, circiter vero, vel post annum trigesimum quintum plerumque ingruit.

## CURA.

Vesicatorium regioni epigastricæ vel emplastrum picis burgundicæ compositum abdomini est admotu; aquæ bathonicæ; balneum tepidum: sed in hac affectione animi alacritas est sustentanda, consortiâ venustorum atque lepidorum, exercitatione præcipue equitatione, venatione, aucupatione, perpetuâ demigratione, navigatione, oblectamentis

mentis omnigenis et anxietatis impediti-  
tione; symptomata dyspepsiæ ab modis  
modo memoratis sunt levanda: pulveris  
rhabarbari grana sex et opii granum  
unum omni nocte, interdium medica-  
menta simplicissima sunt utenda.



### ORDO III. SPASMI.

#### CHARACTER.

Musculorum vel fibrarum musculorum  
motus abnormes.



#### CAP. I. TETANUS (Trismus.)

##### SYMPTOMATA.

Maxillæ inferioris præcipue, acuta, do-  
lorifica et spastica rigiditas; deglutiendi  
difficultas, dolor maxime acutus sub  
cartilagine

cartilagine ensiformi, hinc ad spinam dorsi et illinc ad cervicem et scapulas, jaculans, spasmos ingravescens: quando corpus in posteriora curvatur, opisthotonos appellatur, quando ad anteriora, emprosthotonos.

#### CAUSAE.

Causæ sunt frigus et humiditas corpori calefacto admotæ; puncturæ; lacerationes vel læsiones nervorum vel tendinum; operationes variæ chirurgicæ.

#### PROGNOSIS.

Spasmi violenti et admodum crebri maximum periculum portendunt, morbus sine crisi sensim in salutem terminatur.

#### CURA.

## CURA.

Vinum et opium libere ; cinchona ; unguento hydrargyri frictio ; electricitas ; sed præ omnibus balneum frigidum in convulsionis paroxysmo : in trismo nascentium, qui, infantes intra duas primas a nativitate septimanas adoritur, meconium primo est purgandum tunc oleum succini, moschus, vinum et balneum frigidum uti sunt.



## CAP. II. CHOREA.

## · · CHARACTER.

Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum ætatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterutrus

rutrius lateris, in brachiorum et manuum motu, histrionum gesticulationes referentes; in gressu, pedem alterum sæpius trahentes quam attollentes.

#### CAUSAE.

Systematis mobilitas et debilitas.

#### CURA.

Tonica, qualia, cinchona, ferri, cupri et zinci præparationes; balneum frigidum; electricitas; cucurbitulæ sinè ferro: antispasmodica, ut atropa belladonna, opium, hydrargyrus, succus hyoscyami spissatus, etc. an carbonas potassæ?

CAP.



## CAP. III. EPILEPSIA.

## SYMPTOMATA.

Repente plerumque accedit et nonnunquam ægrum dormientem invadit quam sæpenumerò ante paroxysmum, languorem universum, lassitudinem, capitis dolorem et vertiginem, persentiscit æger; incipit dein haud rarò paroxysmus sensu frigoris, quasi aura frigida caput versus ascendente, quod quamprimum attigerit, ægrotus, si tunc temporis steterit, concidit, clamorem horrendum edens; sensûs omnigeni expers jacet; muscoli corporis totius, potissimum verò faciei, digitorumque violentissime convelluntur; os, oculique distorquentur, materies spumosa ex ore ejicitur; pulsus ab paroxysmi initio celer, exilis vixque percipiendus est, ad  
ejus

ejus finem, plenior, tardior, debilis tamen evadit; his signis sensim decedentibus, paroxysmus, ægro in soporem illabente, finitur, brevi dein ad sese redit, nihil omnino quod per paroxysmum acciderat, reminiscens; in apoplexiâ frequenter finitur.

## CAUSAE.

Causæ prædisponentes sunt quædam systematis nervosi mobilitas et labes hæreditaria: Causæ excitantes sunt stimuli mechanici; stimuli chemici acres; irritationes mentales præcipue gaudium, ira; irritatio a vasis sanguiferis intra cranium distensoriunda; vermes; dentitio; variolæ accedente papularum eruptione; quicquid tensionem vasorum cerebri imminuit, hæmorrhagiæ profusæ, terror, horror, odores complures; venena; aura epileptica.

## DIAGNOSIS.

## DIAGNOSIS.

Ab convulsione omnigena, sopore et impressionum externarum sensu omnino sublatis dignoscetur: ab apoplexia, motibus voluntariis auctis: ab hysteria, globo ad fauces ascendente, cæterisque signis paroxysmum præcedentibus absentibus.

## PROGNOSIS.

In epilepsia symptomatica magis fausta quam in idiopathica; in junioribus minus periculosa, quoniam in pueris sub pubertatis tempus, et in puellis mensibus provenientibus decedere plerumque solet; febris intermittens vel eruptio cutanea sæpe morbum fauste solvit.

CURA.

Si sit morbus symptomaticus primò de-  
G
tegendus

tegendus est atque remedia ei idonea sunt usurpanda; cum adsit plethora, modis jam pridem recensitis, fontanellis et setaceis est amovenda; in paroxysmo, antispasmodica, et stimulantia interna et externa sunt uti: in interval-  
lis tonica, ut, cinchona, cupri, zinci et ferri præparationes; argentum nitratum; balneum frigidum et exercitatio: antispasmodica, e. g. oleum animale, oleum succini rect: hydrargy-  
rus, æther vitriolicus, moschus, stramonium, digitalis, sed eorum potissimum est opium, quod dari debet per plures menses sæpe indies: si omnibus frustra tentatis, diæta, ratio vitæ et regio prorsus sunt immutandæ.

## CAP. IV. PALPITATIO.

## CHARACTER.

Motus cordis vehemens, abnormis.

## CAUSAE.

Cordis vel vasorum vicinorum vitium, plethora, debilitas vel systematis mobilitas.

## CURA.

Hujus affectionis medela ab causis excitantibus quæ evitari debent est petenda; si ab plethora vel debilitate oriatur, remedia iis aptata uti sunt.



## CAP. V. ASTHMA.

## SYMPTOMATA.

Adveniente hora prima vel secunda matutina incipit paroxysmus cum angustia

gnstiae in pectore sensu, spiritus ægre trahitur cum sibilo glottidis strepente, e lecto surgere, ad erectam corporis posituram confugere, cogitur; majore aëris quantitate eget, vox imbecillis efficitur et loquelæ exercitium magis minusve injucundum est, sudor frigidus circa faciem et pectus erumpit, tussis quæ sub paroxysmi initio difficilis erat vel nulla, aurorâ appropinquante, libera, cum sputo mucii sæpe copioso evadit, tunc sublevantur symptomata, sed per aliquot dies seu potius noctes die advesperascente exacerbantur, postea pro tempore cessant omnino; pulsus plerumque celer, debilis, parvus, et urina antea pallida sedimentum deponit: sæpe paroxysmum præcedunt lassitudo, torpor, somnolentia, ventriculi inflatio, ructus crebri, gravitas atque capitis dolor.

CAUSAE.

## CAUSAE.

Atmosphæra humida, frigida, nebulosa; repentinæ tempestatis vicissitudines; podagra retrocedens; febres præcipue intermittentes; evacuationes solitæ repente repressæ; labe hæreditaria. (Causa proxima pendere videtur a spasmodica fibrarum muscularium bronchiorum constrictione.

## DIAGNOSIS.

Ab signis supra recensitis cognoscetur asthma.

## PROGNOSIS.

Ætas juvenilis medici conatibus plurimum favet; sæpe phthisi vel hydrothorace terminatur; respiratio abbreviata et brachiorum paralysis infausta sunt omina.

## CURA.

## CURA.

In paroxysmo, sanguinis missio, ni adsit diathesis phlogistica, plerumque nocet; emetica lenia multum prosunt nec non vesicatoria repetita pectori imposita; clysteres lenes; balneum tepidum: antispasmodica, præsertim opium, æther vitriolicus et asafoetida: expectorantia, ut, scilla, antimonium tartarisatum, spermaceti, etc. Reditui obviam itur, loci vel climatis mutatione, cibo nutriente, blando et ab omni flatulentia immuni; exercitatione; causarum excitantium evitatione; fontanellis; tonicis, e. g. cinchonâ, ferri præparationibus: an digitalis?



## CAP. VI. PERTUSSIS.

## SYMPTOMATA.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strangulans cum inspiratione sonora, (vulgari nomine the Kink insignita) iterata, paroxysmo, mucī quantitate e pulmonibus, faucibus et naribus, rejecta, finito, et per intervalla admodum variantia, iterum renovato, pyrexia nonnunquam comitante.

## CAUSA.

Contagium.

## PROGNOSIS.

Infantibus duobus annis minoribus gravior est morbus; respiratio valde difficilis; pyrexia acuta præcipue si signis pneumoniæ fuerit conjuncta, infaustæ  
sunt

sunt notæ : expectoratio modica; cibi appetentia nunquam prostrata sed post vomitum renovata et epistaxis mitis fausta sunt omina.

#### CURA.

Sanguinis missio aut generalis aut localis si dyspnœa vel pyrexia urgeat: emetica, ad plenam vomitionem, nauseamque ciendum: vesicatoria thoraci admota; balneum tepidum; vapores aquæ ferventis in pulmones accepti; antispasmodica, ut opium, castoreum, moschus, asafoetida, oleum succini; sed præ omnibus tinctura cantharidis ad lenem dysuriam inducendum: tonica ut cinchona, zincum calcinatum: solutio arsenici fowleriana; tinctura digitalis; aëris mutatio: durante morbo alvus leniter soluta foret reddita.

## CAP. VII. PYROSIS.

## CHARACTER.

Epigastrii dolor urens et constrictionis sensus positura erecta auctus, vacuo plerumque ventriculo accedens, cum copia humoris aquei, plerumque insipidi, aliquando acris eructata.

## CAUSAE.

Frigus extremis admotum et animi pathemata violenta.

## CURA.

In paroxysmo opium, æther, aliaque antispasmodica sunt administranda, postea nux vomica.

CAP.

## CAP. VIII. COLICA.

## SYMPTOMATA.

Dolor abdominis, præcipue circa umbilicum torquens, ejus retractio versus spinam; musculorum abdominis spasmi, plurima quasi tubercula ad tactum sacci pomis referti instar, efficientes; vomitus; alvus astricta; pyrexia nulla: quando peristalticus intestinorum motus invertitur, Ileus appellatur.

## CAUSAE.

Causæ remotæ sunt frigus, fæces induratae; bilis acris; concretiones calcareae; venena in corpus recepta præcipue plumbum; flatus. Causa proxima esse videtur spastica alicujus intestinorum partis contractio.

## DIAGNOSIS.

## DIAGNOSIS.

Ab enteritide dignoscitur dolore torquente, umbilici retractione, pulsu, pyrexiaë absentia et dolore pressu immutato : ab hepatitide et nephritide signis aliubi recensitis et pyrexia absente.

## PROGNOSIS.

Dolor migrans sensimque cessans, et alvus catharticis respondens fausta sunt signa : dolor fixus, violentus, vel eo subito cessante, alvus pertinacitur astricta, singultus, delirium, infaustæ sunt notæ.

## CURA.

Venæsectio, si adsit diathesis phlogistica secundum pulsus statum et ægri vires, repetita, ni adsit magna debilitas ;

tas: antispasmodica, ut opium, hyoscyamus, semicupium, abdominis fomenta vel vesicæ aquâ calidâ refertæ abdomini admotæ, epispastica: cathartica lenia, ut natron vitriolatum, tartari crystalli, sennæ infusum, oleum ricini, et iis nihil valentibus, jalapium, calomelas vel colocynthis; enemata primò lenia, postea ex terebinthina, fumis vel infuso nicotianæ parata; his omnibus incassum tentatis, aqua frigida nudis femoribus et cruribus est affundenda, vel hydrargyrus ore est datu vel aqua calida manu largâ in anum est immittenda: si ab flatu oriatur antispasmodica.

Colica Pictonum cognoscitur præeunte ponderis vel molestiæ in abdomine, præcipue circa umbilicum, sensu; accedente dolore colico, primum  
levi,

levi, non continuo, et præcipue post pastum aucto, tandem graviori et fere perpetuo, cum dolore brachiorum et dorsi in paralysin demum abeunte: Curatur hæc affectio hydrargyri præparationibus tali quantitate datis opio conjuncto ad lenem salivationem ciendum; catharticis lenibus modo memoratis; balneo tepido et aliis supra recensitis: venæsectio summo periculo stipatur: ad paralysin aquæ bathonicae.



## CAP. IX. CHOLERA.

### SYMPTOMATA.

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens, anxietas, tormina, magna virium prostratio; pulsus celer, exilis, frequens; surarum  
spas-

spasmata, mense Augusti plerumque grassans; intra viginti quatuor horas sæpe jugulat.

#### CAUSAE.

Causæ remotæ sunt æstas calida; acria ingesta; crapula; fructus immaturus nimis libere sumptus; miasmata ex paludibus orta; bilis acris. Causa proxima est duodeni intestini constrictio spastica.

#### PROGNOSIS.

Somnus vomitu cessante accedens aut morbus ad diem septimum excurrens, fausta sunt indicia; rejecta admodum nigra; sitis, calorque vehementes, pulsus valde debilis et intermittens, singultus, syncope, convulsiones, infausta sunt signa.

#### CURA.



## CURA.

Diluentia ex aqua tepida vel jusculo pullino libere sunt adhibenda et in alvum immittenda; postea antispasmodica præcipue opium internè et in clysteribus; si surarum spasmata urgeant enemata anodyna et surarum cum camphora oleo soluta frictio: morbo profligato tonica; antispasmodica; nutrientia.



## CAP. X. DIARRHŒA.

## CHARACTER.

Dejectio frequens fæcum naturalium, muci, humoris lactei vel ingestorum parum mutatorum cum torminibus, nausea et vomitu; morbus non contagiosus,

giosus, pyrexia nulla primaria et sine tenesmo.

#### CAUSAE.

Causæ remotæ sunt, frigus pedibus applicatum; vasorum intestinorum absorbentium actio imminuta; crapula; acrimonia ingesta; perspiratio subito repressa; effluvia putrida; fruges nimis libere sumptæ; intestinorum tunicarum inflammatio erythematica; vermes; arthritis retrocedens et rheumatismus. Causa proxima est intestinorum motus peristalticus auctus.

#### DIAGNOSIS.

Diarrhœa, ab omni alio morbo signis jam nunc descriptis facile cognoscetur.

#### CURA.

Emetica repetita et postea dosi refracta,  
ta,

ta, ad nauseam movendum; diluentia; demulcentia, qualia thea ex seminibus lini parata, decoctum hordei, decoctum cornu cervi, etc. opiata: astringentia ut kino, alumen, catechu, extractum hæmatoxyli et similia: tonica ut cinchona, angusturæ cortex, cascarrilla, etc. absorbentia: diæta præcipue ex carne assa vel jusculis: diarrhœa, typhum graviolem et podagram retrocedentem comitans, remediis idoneis aliubi recensitis est amovenda.



## CAP. XI. DIABETES.

### SYMPTOMATA.

Urinæ copia magnopere aucta, primò insipida postea saporis mellei et coloris subviridis ingestorum pondus æquans vel superans; sitis perpetua; appetitus

petitus nonnunquam vorax; muci expuitio perpetua, fauces aridæ; cutis arida plerumque squamosa; pedum et talorum œdema; cutis calor urens levissimo sine sudore; pyrexia hectica.

#### CAUSAE.

Causæ sunt omnes systema infirmantes; liquores spirituosi nimis libere sumpti; frigus corpori admotum; venus immodica; diuretica nimis acria; evacuationes immodicæ; morbi prægressi. Causa proxima esse videtur, status ventriculi morbosus potestates naturales digestionis et assimilationis impediens

#### CURA:

Diæta ex cibo animali pingui, vegetabilibus ex toto evitatis; emetica: diaphoretica

phoretica præcipue pulvis ipecacuanhæ compositus; sales alkalini; ammonia hepatisata; epispastica parva renum regioni; hydrargyri præparationes; camphora; astringentia ut gallarum pulvis cum aqua calcis; alumen: tonica; corporis inunctio cum axungia; indusium laneum induere convenit.



## CAP. XII. HYSTERIA.

### SYMPTOMATA.

Ventris murmura et inflatio; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et fauces ascendentis, ibique strangulantis; convulsiones, quibus ægræ pectus manu violenter plangunt; sopor; his aliquandiu manentibus,

bus, ægræ lachrymantes, ridentesque vicissim; flatus per ructum e ventriculo expulsus, suspiriis crebris ex imo pectore tractis, quasi e somno excitatæ ægrotæ sensum, motumque recuperant; urinæ limpidæ copiâ profusâ sæpe præcedente; animo nec sponte vario et mutabili.

#### CAUSAE.

Causæ remotæ sunt systematis nervosi mobilitas et plurimæ epilepsiam producentes. Causa proxima pendere videtur ex affectione uteri spasmodica.

#### DIAGNOSIS.

Ab epilepsia, urinæ limpidæ copia profusa paroxysmum præcedente, mortis metu, et globo hysterico, dignoscetur.

#### CURA.

## CURA.

In paroxysmo obest venæsectio si morbus diu manserit; sed antispasmodica, qualia, opium, castoreum, camphora, asafoetida internè et per enemata sunt usurpanda; enema ex aqua gelida est immitti; stimulantia naribus sunt admovenda, ut spiritus ammoniæ succinatus, etc.: Reditui ejus occurritur cinchona; ferri præparationibus; antispasmodicis; exercitatione et balneo frigido.



## CAP. XIII. HYDROPHOBIA.

## SYMPTOMATA.

Incerto post morsum plerumque die circa vulneris oras, rubor, calor, tensio dolens; eodemque tempore circa  
locum

locum laborantem, dolores vagi atque spasmi sese ostendunt; lassitudine, languore, anxietate, suspiratione frequenti, et solitudinis appetentia corripitur æger et somnia horrida vexant; his signis durantibus, et per diem unum, alterumve ingravescentibus, potionis cujuslibet utpote convulsionem pharyngis cientis fastidium et horror superveniunt; magna saliva viscidæ copia expuitur, et mordendi cupiditas in paroxysmo accedit.

## CURA.

Ad morbum præveniendum partes morsæ statim vel ante diem quartum sunt extirpandæ, et postea aquâ tepidâ salinâ sunt abluendæ, vulnus apertum servari debet applicationibus stimulantibus ut argento nitrato vel litu mercuriali



riali circa partem affectam; salivatio lenis est promovenda: morbo in conspectum jam veniente, vinum, moschus, oleum internè et externè; opium largâ manu; cinchona: unguentum hydrargyri externè est admotu ad salivationem quamprimum ciendum: an balneum frigidum?



#### ORDO IV. VESANIÆ.

##### CHARACTER.

Mentis judicantis functiones læsæ sine pyrexia vel comate.



#### CAP. I. MELANCHOLIA,

##### CHARACTER.

Insania partialis chronica, moesta, meditabunda plerumque alvo astricta et  
dyspepsiæ

dyspepsiæ signis stipata; delirant melancholici sine furore, et sine febre, de uno potissimum objecto constanter, delirant circa semetipsos, aut suum statum, de reliquis objectis adhuc sat bene ratiocinantes, sese perdendi cupiditate comitante.

#### CAUSAE.

Labes hæreditaria: pathemata animi contristantia: evaeuationes immoderate, ingurgitatio liquorum spirituosorum iterata, et temperamentum melancholicum.

#### DIAGNOSIS.

Ab hypochondriasi, dyspepsiæ signis sæpe absentibus et delirio melancholico supra memorato, dignoscetur melancholia.

#### PROGNOSIS.

## PROGNOSIS.

Si labi hæreditariæ debetur, vel diu perstiteret difficilime amovetur; nonnunquam fauste solvitur morbus diarrhœâ, hæmorrhagiâ vel eruptione cutaneâ; si æger somno reficiatur, et mens cogitationibus melancholicis averti possit, spes est

## CURA.

In hoc morbo mens ut in hypochondriasi est delectanda ludis, musice, libris, de rebus levibus, jocosisque tractantibus, exercitatione et cum illis ratiocinatione de rebus iis contrariis quibus agitantur et omnibus modis ad hypochondriasin aptatis; melancholici nunquam incomitati forent; alvus astricta et dyspepsiæ signa remediis antea re-

H

censitis

censitis sunt amovendæ; diætâ foret nutriens et facilis concoctionis.



## CAP. II. MANIA.

### CHARACTER.

Delirium apyretum circa quævis objecta, cum furore, audacia et robore magno; maniaci habent plerumque lucida intervalla; subin est mania periodica; unde lunatici.

### CAUSAE.

Studium nimis intensum; pathemata animi violenta; frustratio iterata; tumores et exostoses intra cranium; insolatio; profluvia solita suppressa; vini nimius usus; labes hæreditaria; temperamentum sanguineum; melancholia diu perdu-

perdurans: Causa proxima est sensorii excitatio aucta.

## DIAGNOSIS.

Ab phrenitide facillime distinguitur mania, namque febre semper caret mania, eâ contra phrenitis semper stipatur.

## PROGNOSIS.

Hæmorrhagiæ largæ; diarrhœa vel febris intermittens salutem secum sæpe afferunt.

## CURA.

Imprimis necessarium est ut in loco frigidiusculo et tenebroso tutò detineretur, et si morbus non diu manserit sanguis libere et cito est detrahendus, aliter non; catharticis lenibus indies sollicitanda est alvus; emetica repetita sunt admini-

administranda; opium, camphora, digitalis, larga manu sunt dari: applicationes frigidæ et vesicatoria capiti raso sunt admovendæ; gratiolæ pulveris grana decem mane et vespere; sed præ omnibus in paroxysmi violentia balneum frigidum.

# CACHEXIÆ.

---

## CLASSIS III. CACHEXIÆ.

### CHARACTER.

Totius vel magnæ partis corporis habitus depravatus ;  
sine pyrexia primaria vel neurosi.

## ORDO I. MARCORES.

### CHARACTER.

Corporis totius macies.

## CAP. I. TABES.

### CHARACTER.

**C**ORPORIS totius macies et debilitas  
gradaria, pyrexia hectica, plerumque  
affectio symptomatica.

CURA.

## CURA.

Morbus primarius primo est investigandus, et remedia ei idonea sunt administranda; si ab glandularum mensesentricarum obstructione oriatur, hydrargyri præparationes sunt utendæ donec tumor abdominis et durities subsident; postea ferri præparationes, colomba, cinchona.



## CAP. II. ATROPHIA LACTANTIUM.

## SYMPTOMATA.

Corporis macies et debilitas cum rubedine genarum circumscripta, doloribus in aliqua thoracis parte vagis, tussi, dyspnœa, pulsu solito frequentiori et aliquantulum duro comitantibus, pyrexia hectica tandem superveniente.

## CAUSAE.



## CAUSAE.

Debilitas systematis a nutritio deficiente ; et thea nimis libere sumpta.

## CURA.

Imprimis infans e lacte est depellendus ; si dyspnœa, tussis vel thoracis dolor premant, sanguinis missio parca, generalis vel topica multum conducet ; epispastica invicem excipientia thoraci admodum ; laxantia lenia ; demulcentia ; diæta ex lacte, farinaceis vel jusculis : atsi debilitate sola oriatur tonica sunt utenda, ut ferri præparationes, cinchona, acida mineralia, diæta nutriens, etc.

## ORDO

## ORDO II. INTUMESCENTIÆ.

## CHARACTER.

Totum vel magna corporis pars extrorsum tumens.



## FLATUOSÆ.

## CAP. I. EMPHYSEMA.

## CHARACTER.

Corporis intumescentia tensa, elastica, sub manu crepitans, nonnunquam magna spirandi difficultate et anxietate stipata.

## CAUSA.

Sine causa manifesta frequenter oritur emphysema, sed plerumque thoracis vulnera id inducunt.

## CURA.

## CURA.

Tela cellulosa est scarificanda et aër digitis est expellendus; si dyspnæa urgeat, venæsectio et laxantia sunt usurpari.



## CAP. II. TYMPANITES.

## SYMPTOMATA.

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora, nequaquam fluctuosa, in quocunque corporis situ formam, molemque servans; alvus astricta; cæterarum partium macies; morbo violento stranguria vel ischuria superveniente; pyrexia; præcedunt nonnunquam borborygmi, ventriculi et intestinorum inflatio et ructus.

## DIAGNOSIS.

## DIAGNOSIS.

Ab ascite dignoscitur intumescencia elastica et sonora fluctuatione absente.

## CURA.

Enemata et cathartica laxantia; antispasmodica qualia opium, oleum anisi et similia tonicis et aromatibus conjunctis; nivis abdomini applicatio; acidum sulphuricum ad alimentorum effervescentiam cohibendum; abdominis fasciâ circumvolutio; fistula pro enemate in rectum est immittenda, ibi per tempus relinquenda, iteranda; abdominis frictio linimento ammoniæ.

## AQUOSÆ SIVE HYDROPE.

## CAP. III. ANASARCA.

## SYMPTOMATA.

Corporis totius sed primo pedum atque talorum intumescencia mollis inelastica, advesperascente primo insultu comparens, digiti impressi vestigium aliquandiu retinens; cutis pallor; sitis magna; urinæ copia multum imminuta, subrubra; dyspnœa et cutis arida.

## CAUSÆ.

Causæ remotæ sunt systematis debilitas liquorum spirituosorum ingurgitatione inducta: obstructions in pulmonibus, corde et hepate; nimia fluidorum ingurgitatio; evacuationes immodicæ; hæmorrhoidum fluxus obstructus; inflammatio interna;

interna; ductus thoracici, lymphaticorum, ureterum vel vesicæ ruptura ascitem inducens: Causa proxima constat ex fluidorum effusione acuta, absorptione imminuta vel ambobus.

#### PROGNOSIS.

Si nulla viscerum obstructorum sint signa; si urina non multum imminuatur; si sitis minus urgeat, viribus eodem tempore illibatis faustum dare judicium licet.

#### CURA.

Aqua collecta puncturis parvis vel fontanellis est exhaurienda; fasciæ extremis sunt admovendæ; crurum frictio præcipue mane; emetica repetita; cathartica, cujusmodi sunt, gambogia, jalapium, colocynthis, calomelas, bryonia, gratiola, tartari crystalli, et elaterium, sed tartari crystalli primarium locum possident

possident si ad quantitatem uncix̄æ omni vel alterno mane in aqua satis larga soluti dentur; diaphoretica ut antimonium tartarisatum vel pulvis ipecacuanhæ compositus: diuretica, ut colchicum, scilla, kali acetatum, tinctura cantharidis, succus cinaræ spissatus, et digitalis: his omnibus frustra tentatis, salivatio lenis ope hydrargyri est promovenda; tonus systematis restituitur exercitatione et tonicis, ut cinchona, quassia, ferri præparationibus et balneo frigido: si pulsus plenus, durus et tensus evadat, venæsectio multum prodest.



#### CAP. IV. IIYDROCEPHALUS.

##### SYMPTOMATA.

Inter morbi initia languet æger; nausea sæpe vomitu una vel altera vice quotidie tentatur; capitis dolor regionem superciliarem,

perciliarem, verticem vel cervicem lacinat, nonnunquam cum ventriculi affectionibus alternat; caput aliquando ad unum magis quam alterum latus inclinatur, lumen oculi refugiunt, plorat et vigilat plerumque miser; si adsit somnus, dentibus nonnunquam frendet et nasum digitis carpit, subito perterritus e somno excitatur, alvus plerumque astringitur et pulsus ab morbi initio frequentior quam in sanis invenitur: signis supra memoratis invalescentibus, strabismus aliquantulus accedit, pupilla paululum dilatatur, vomitio increbrescit, capitis dolor eoûsque intenditur et spirandi difficultas urget, calor corporis, capitis præcipue augetur, febris nunc instat et sub vespere gravescit, vultus rubedine subinde obducitur; arteriarum pulsus hucusque citatiores, jam tardiores,



tardiores, inæquales et intermittentes evadunt, dolor aliquantulum mitescere videtur, et sopore vigiliam stadii prioris excipiente in coma tandem incidit æger, manibus capiti sæpe admotis; strabismus augetur, pupillæ magis dilatantur et cæcus denique fit omnino, ingesta non amplius vomitu rejiciuntur, alvus manet astricta, nonnunquam tamen hic temporis vermes inferius deji-ciuntur; cum per dies quosdam sub hac forma perduraverit morbus, arteriarum pulsus denuo fiunt æquales, adeo autem debiles nec non frequentes ut vix numerari queant; spiritus difficillimè et cum stertore fertur; toto corpore, præcipue in artubus maculæ rubræ sese ostendunt, et diræ tandem convulsiones miserum e vivis eripiunt.

## CAUSA.

Hydrocephali causa esse videtur cerebri alicujus partis inflammatio, effusionem inducens.

## DIAGNOSIS.

Cephalalgia cum vomitu; lucis impatientia et morbo invalescente strabismus, pupillæque dilatatæ hydrocephalum ab aliis morbis dignoscunt.

## PROGNOSIS.

Stupor, oculorum caligo, pulsus debilis et frequens, infausta sunt signa.

## CURA.

Sanguinis missio generalis vel topica, repetita, præcipue in morbi primo stadio; cathartica cum calomelane et gambogia;

gia; litus mercurialis; epispastica invicem excipientia et applicationes frigidæ capiti; errhina, ut hydrargyrus vitriolatus, proportionē grani, ad sacchari in pulverem triti grana quindecim, sensim in nares inflatu; ictus electrici lenes ad caput admoti; in secundo et ultimo stadio, cinchona, vinum, opium et digitalis.



## CAP. V. HYDROTHORAX.

### SYMPTOMATA.

Dyspnœa, pectoris oppressio molesta; faciei pallor; pedum œdemata; urina parca; sitis magna; tussis in initio sicca, postea humida; extrema frigida; brachiorum torpor; decubitus difficilis; subita et spontanea ex somno cum pal-  
pitatione

pitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans: si unum latus plus quam alterum afficiatur, ad latus affectum inclinatur æger, et brachium ejusdem lateris magis est torpidum.

#### DIAGNOSIS.

Ab empyemate internoscitur quod in eo inflammatio fuit, febris hectica est, quibus hydrothorax caret.

#### CURA.

Diuretica præcipue digitalis et scilla, opio et hydrargyri præparationibus conjunctis; epispastica pectori; fontanellæ, et omnia ad anasarcam aptata: Paracentesis?

## CAP. VI. ASCITES.

## SYMPTOMATA.

Abdominis intumescencia tensa, æqualis, vix elastica, ad ictum fluctuosa: urina parca, admodum rubra; cutis arida; sitis perpetua; alvus pertinaciter astricta; vultus pallidus et tumidus; tussis sicca; dyspnœa; somnolentia; dolor in epigastrii regione lancinans.

## DIAGNOSIS.

Ab tympanitide aquæ fluctuantis sensu dignoscitur, ubi venter altera manu pulsatur, altera premitur; in hydrope cystica intumescencia non æqualis est sed circumscripta, et systematis vigor minus est imminutus.

## PROGNOSIS.

Vires multum imminutæ; somnolentia; coma; respiratio valde laboriosa; infasta sunt indicia.

## CURA.

Emetica præcipue cuprum vitriolatum; diuretica; cathartica ni alvus sit soluta; abdominis frictio diuturna digitis in oleo primum mersis; paracentesis et alia remedia antea recensita ad hydropem idonea: si ab statu viscerum morbosus oriatur, hydrargyri præparationes sunt utendæ: an digitalis?

## INTUMESCENTIÆ SOLIDÆ.

## CAP. VII. RACHITIS.

## SYMPTOMATA.

Plerumque inter nonum ætatis mensem, annumque secundum, cum musculorum flacciditate, vultu pallido, tumido, motus et exercitationis aversione compareret: tunc caput, præcipue sinciput, artusque magnopere tument; sternum acutum et prominens evadit, costæ depressæ, ossa mollita, curvata; abdomen tumidum fit et tensum; alvus soluta; cætera marcescunt; dentes tarde erumpunt et cito dilabuntur; acumen ingenii præmaturum apparet.

## CAUSAE.

Debilitas; aër humidus et impurus; lac  
minus

minus nutriens; labes hæreditaria; habitus corporis scrofulæ obnoxius. Causa proxima esse videtur materie osseæ defectus.

## CURA.

Emetica lenia; tonica ut ferri et zinci præparationes rhabarbaro conjunctæ; corporis pannis laneis frictio: exercitatio; diæta nutriens; balneum frigidum et aëri sicco expositio. Prophylaxis exercitatione et lavatione frigida est petenda: an balneum tepidum?



## ORDO III. IMPETIGENES.

## CHARACTER.

Cachexiæ, cutem et externum corpus præcipue deformantes.

CAP.



## CAP. I. SCROFULA.

## SYMPTOMATA.

Glandularum conglobatarum, præsertim in collo nonnunquam in artubus, tumores, doloris expertes, duri et digito prementi cedentes, tandem in ulcera mali moris, ad sanandum perdifficilia, abeuntes; labium superius et nasi columnæ tumentes; facies florida; oculi plerumque magni, debiles; cutis lævis; abdomen tumidum; pubertate inuente frequenter sese abscondit.

## CAUSAE.

Labes hæreditaria; ær impurus, humidus, nebulosus; systematis lymphatici constitutio certa.

## CURA.

## CURA.

Ponto immersio vasto; aquæ marina, chalybeatæ, sulphuræ; digitalis; barytes muriata; natron præparatum cum cinchona forma electuarii, in prioris proportionem drachmarum duarum ad posterioris unciam; opium in dosi grani partis quartæ ad dimidiam bis indies; ferri et zinci præparationes: applicationes topicæ, quales aqua marina, cerussæ acetatæ solutio in proportionem uncie cerussæ ad aquæ libram; cinchonæ pulvis et cerussa in prioris drachmarum septem proportionem, ad posterioris drachmam; vel zincum calcinatum ulcera inspergendum est; cataplasmata ex oxali acetosella confecta ulceribus et tumoribus. Solutio muriatis calcis multum mihi visa est profuisse. An gas oxygenium? an electricitas?

CAP.

CAP. II. SYPHILIS.

CHARACTER.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum, oriens, cum circa colis glandem vel pudenda pruritu, quem subsequuntur ulcuscula venerea (chancres appellata) bubones, tonsillarum, faucium, cutisque ulcera, præsertim ad marginem capillitii, papulæ corymbosæ in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; ossium præsertim corpore incalescente dolores; nodi, exostoses, etc.

CURA.

Hydrargyrus interne et externe est adhibendus donec sapor metallicus in ore excitatur, vel gingivæ teneræ redduntur, vel salivatio lenis inducitur; ulcera quam primum sunt sananda applicatione ar-

genti nitrati, æruginis pp., unguenti hydrargyri vel hydrargyri nitrati; ad bubones recentes hirudines parti tumefactæ sunt applicandæ et postea vesicatorium; opium, decoctum sarsaparillæ simplex et compositum medelam accelerant; ad tonsillarum ulcerationem, fumigatio cum hydrargyro præcipitato cinereo, hydrargyro sulphurato rubro vel gargarismatibus ex hydrargyro muriato paratis: ad verrucas, pulvis sabinæ, ammonia muriata, tinctura ferri muriati etc: lobelia syphilitica et acidum nitrosum nunc temporis beneficio sæpe utuntur.



### CAP. III. GONORRHŒA.

#### SYMPTOMATA.

Tribus, quatuorve diebus a contagione  
accepta,

accepta, pruritus insolitus, circa penis glandem, quæ tumida et tensa est, per-sentitur; os urethræ solito apertius est et tumidum; guttulæ materie puriformis ex ea exprimi possunt; profluvium magis tenue, quantitate auctum, colore varians et sæpe sanguine tinctum evadit; urina dolore et ardore redditur; morbo ingravescente, penis incurvatio dolorifica vel chordee, phymosis, paraphymosis, hernia humoralis, urethræ strictura, etc. superveniunt.

## CURA.

Injectiones ex zinco vitriolato cerussa acetata, et similibus vel potius ex hydrargyro muriato in proportionem grani unius, ad aquæ rosæ uncias octo, sæpe indies sunt utendæ; si adsit inflammatio vehemens, oleum tepidum, mucilago arabici gummi vel opii solutio est injici;

1 2                      regimen

regimen antiplilogisticum stricte est administrandum; venæsectio; enemata emollientia; laxantia; diluentia; applicationes sedativæ parti; sacculus suspensorius per totum morbi decursum uti debet: ad incurvationem penis dolorificam opium interne, vel litus cum unguento ex camphoræ drachmis duabus solutæ spiritus vinosi guttis paucis et axungię uncia dimidia confecto: ad herniam humoralem, hirudines parti dolenti, enemata laxantia, balneum tepidum, opiata; cataplasmata emollientia scroto, applicationes sedativæ peni ex cerussa acetata paratæ, et in lecto ægri detentio: si partes duræ remanserint, litus mercurialis, cicuta et decoctum sarsaparillæ compositum uti sunt: tonus partibus affectis redditur injectionibus astringentibus.

## CAP. IV. SCORBUTUS.

## SYMPTOMATA.

Lassitudo inusitata; motui aversatio; animi dejectio; facies pallida, tumida; magna virium prostratio; animi deliquium post motum; cordis palpitatio; dolores musculorum vagi sæpe sunt morbi prima indicia; sanguis dissolutus e gingivis laxis, spongiosis, promanat; anhelitus gravissime fœtet; gingivæ exulcerantur, dentes nudantur et vacillant; cutis sicca et aspera est in initio, dein maculæ latæ, lividæ præsertim in cruribus et femoribus, rarius in facie, et ulcera in totum corpus sese manifestant; membra tument, dolent, poplitum præsertim tendines rigent, cruraque versus femora retrahunt; in morbo inveterato hæmorrhagiæ ab partibus corporis variis erumpunt,

erumpunt, ab ore, naribus, ano, digitis etiamque extremis; pulsus plerumque debilis est; urina rubra, fœtida et post aliquot horas pelliculâ oleosâ oblecta; lingua fere naturaliter se habet; alvus per totum morbi decursum sæpe pertinaciter astringitur, nonnunquam vero diarrhœa torminibus comitata vexat.

## CAUSAE.

Causæ remotæ sunt victus animalis putrescens, salitus; rei vegetabilis inopia; exercitatio omissa; frigus; humor; affectus animi deprimentes; immundities: Causa proxima esse putatur sanguinis status præternaturaliter salinus.

## PROGNOSIS.

Diarrhœa mitis; cutis mollis, humida;  
æger



æger facilius motum vel exercitationem tolerans, felicem eventum prænunciant.

## CURA.

Cibus recens animalis et vegetabilis; fructus horæi, subacidi; potus fermentati, quales, succus e pomis expressus; bynes infusum; cerevisia bene lupulata; cerevisia ex abie confecta; mundities summa; stimulantia, ut, raphanus rusticanus, sinapi, etc. vinum; ferri præparationes; cinchona; acida mineralia; opium: ad gingivas spongiosas, gargarismata ex aluminis solutione confecta, in proportionem aluminis drachmarum quatuor ad aquæ uncias sex; cataplasmata ex oxali acetosella ad ulcera sunt admovenda: nuper nitrum in aceto solutum summo cum fructu usurpatum fuit, in proportionem uncie dimidiæ  
nitri

nitri ad uncias quatuor aceti, cujus dosis est ab uncia dimidia ad uncias duas, bis, ter, quaterve in die; ulcea solutione sunt lavanda: gas oxygenium.



## CAP. V. ELEPHANTIASIS.

### CHARACTER.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus tactus imminutus, vel abolitus; facies tuberibus deformis; anhelitus valde fœtidus; vox rauca et nasalis; pulsus tardus et debilis; morbo ingravescente, artus, putredine corrupti, decidunt.

### CURA.

Sanguinis missio; cathartica lenia; bal-  
neum.

neum tepidum ; diæta nutriens concoctu facilis ; antimonii et hydrargyri præparationes, præcipue hydrargyrus muria- tus ; arsenicum ; acidum sulphuricum ; decoctum guaici, sarsaparillæ composi- tum, et ulmi liberè ; tinctura canthari- dis ; jus viperinum ; cinchona.



## CAP. VI. LEPRO.

### CHARACTER.

Cutis escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruri- ginosa.

### CURA.

Fontanellæ ; liquoribus fermentatis abs- tinentia ; exercitatio lenis ; antimonii præpara-

præparationes; decoctum ulmi et alia remedia supra recensita.



## CAP. VII. ICTERUS.

### SYMPTOMATA.

Hypochondrii dextri dolor obtusus, gravitatis et tensionis circa præcordia sensus; corporis universi torpor et lassitudo; cutis pruritus et ariditas; oris amaritudo; nausea sæpe vomitus; oculorum, cutisque flavedo; fæces albidæ; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens; alvus plerumque astricta, nonnunquam pyrexia.

### CAUSÆ.

Causæ remotæ sunt; calculi e bile confecti, bilis in intestina descensum prohibentes;

bentes; ductûs spasmi; tumores hepatitis vel partium vicinarum ductum communem choledochum comprimentes; bilis in intestinis retentio: Causa proxima est bilis absorptio vel regurgitatio in systema sanguiferum.

## CURA.

Si ab calculis vel spasmo oriatur, eadem remedia sunt usurpanda; si dolor hypochondrii dextri graviter urgeat, vel si ulla pyrexix signa adsint, sanguis ægroto detrahatur; balneum tepidum; emetica lenia; opiata vel hyoscyamus; fomenta; epispastica; laxantia, qualia alœ, oleum e seminibus ricini, sapo, kali præparato et amaris conjunctis; enemata emollientia; diluentia tepida; æther cum ovorum vitellis: ictus electrici ductum communem choledochum transmissi, postea aqua seltzerana, cinchona  
et

et ferri præparationes : si ab bilis in intestinis retentione proveniat, alvi purgatio : si ab tumoribus vel visceribus morborum oriatur, hydrargyrus, cicuta, etc.

LOCALES.

# LOCALES.

---

## CLASSIS IV. LOCALES.

### CHARACTER.

Partis, non totius corporis, affectio.

## ORDO I. DYSÆSTHESIÆ.

### CHARACTER.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum externo-  
rum vitio.

## CAP. I. AMAUROSIS.

### CHARACTER.

**V**ISUS imminutus vel prorsus abolitus,  
sine vitio oculi evidente, plerumque cum  
pupilla dilatata et immobili.

### CAUSAE.

Causæ remotæ sunt, cerebri compressio  
ab

ab congestione vel vi externa; atonia vel nervorum opticorum paralysis. Causa proxima est retinæ insensilitas.

#### CURA.

Si ab compressione vel congestione proveniat, remedia iis aptata sunt usurpanda; si ab atonia vel paralysi nervorum opticorum oriatur, stimulantia sunt utenda, qualia, epispastica temporibus; electricitas et scintillæ et ictus; errhina ut hydrargyrus vitriolatus cum pulveris glycyrrhizæ octuplo commistus; remedia stimulantia interna ad paralyzin idonea sunt administranda.



### CAP. II. DYSECOEA.

#### CHARACTER.

Auditus imminutus vel abolitus.

#### CAUSAE.



CAUSAE.

Vitium organicum ; nimia auris siccitas ; cerumen multum induratum ; membranarum inflammatio ; eustachii tuba obstructa ; atonia vel paralysis nervi acustici ; syphilis.

CURA.

Si ab vitio organico proveniat, immedicabilis est : si ab nimia auris siccitate vel cerumine indurato, solutio natri muriati et emollientia sunt utenda : si ab inflammatione, sanguinis missio topica et alia inflammationi aptata sunt adhibenda, et aër externus est excludendus: si ab eustachii tuba obstructa, gargarismata, injectiones per syringem ; errhina ut pulvis asari et hydrargyrus vitriolatus ; ubi ex magno fragore melius audit,

dit, jubendus est, ut obturatis ore et naribus, aërem expiratum vi, in eustachii tubam impellat, quo subito sæpe auditus restituitur: si ab atonia vel paralyti, stimulantia, electricitas: si ab lue venerea, hydrargyri præparationes sunt utendæ.



## ORDO II. APOCENOSES.

### CHARACTER.

Fluxus sive sanguis sive humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetive fluidorum aucto.

CAP.

## CAP. I. ENURESIS.

## CHARACTER.

Urinæ e vesica fluxus involuntarius non dolens.

## CAUSAE.

Vesicæ sphincteris atonia vel paralysis; irritatio vel compressio.

## CURA.

Atonia, perinæi lavatione frigida, epispasticis ei admotis et tonicis internis est amovenda; paralysis est depellenda epispasticis, electricitate et stimulantibus: si ab irritatione vel compressione oriatur, remedia iis propria sunt administranda.

ORDO

## ORDO III. EPISCHESES.

## CHARACTER.

Excernendorum suppressiones.



## CAP. I. ISCHIURIA RENALIS.

## CHARACTER.

Urinæ suppressio absoluta; prægresso renum morbo, cum dolore vel molesto gravitatis sensu in regione renum, femoris stupore, nausea sæpe vomitu, et sine hypogastrii tumore vel ad mingendum stimulo.

## CAUSAE.

Nephritis; calculi; sanguis concrementus vel pus in renum pelvi, spasmi vel renum paralysis.

## CURA.

## CURA.

Si ab nephritide oriatur, remedia idonea sunt utenda quæ aliubi recensentur : si ab calculo, sanguinis missio plerumque nocet, ni adsit plethora ; aliter non, balneum tepidum ; opiata, enemata emollientia laxantia vel ex terebinthina parata ; diluentia ; antispasmodica externe ; alvi lenis purgatio cum oleo olivæ vel oleo e seminibus ricini : si ab spasmo, eadem remedia conveniunt : si ab sanguine congrumato, balneum tepidum ; anodyna ; enemata etc ; si ab paralysi, electricitas ; stimulantia ; epispastica etc.



## CAP. II. ISCHURIE URETERICA.

## CHARACTÉR.

Urinæ suppressio absoluta ; prægresso  
renum

renum morbo, cum doloris vel molestiæ sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore vel ad mingendum stimulo : Causas easdem ut prior agnoscit, et eandem medendi rationem postulat.



### CAP. III. ISCHURIA VESICALIS.

#### CHARACTER.

Urinæ suppressio cum hypogastrii tumore, vesicæ figuram primo referente, dolore ad cervicem vesicæ vel ponderis sensu molesto, et frequenti ad mingendum stimulo.

#### CAUSAE.

Cystitis; fibrarum musculosarum vel tunicarum vitium; calculi; sphincteris  
vesicæ

vesicæ spasmus; vesicæ paralysis; vesica diutius distenta; sanguis grumosus, mucus vel pus circa vesicæ collum; scybala; flatus; abscessus; hæmorrhoides; graviditas.

## CURA.

Si adsit inflammatio, sanguis est detrahendus, aliter non; balneum tepidum est uti; enemata laxantia; pubis frictio cum camphora in oleo soluta; opiata; his nihil valentibus, catheter immitti debet, vel punctura vesicæ: an emeticum? si ab tunicarum vitio proveniat, hydrargyrus, cicuta et electricitas: si ab calculis, lithontriptica ut aqua kali puri, aqua super carbonatis potassæ vel sodæ, enemata anodyna, lapis snillus, uva ursi et his nihil juvenibus, peragenda sit lithotomia: si ab spasmo, venæsectio, balneum tepidum, opiata, enemata

enemata emollientia : si ab paralysi, remedia antea recensita : si ab vesica diutius distenta, applicationes frigidæ hypogastrio sunt admovendæ : si ab sanguine grumoso, muco vel pure, balneum tepidum ; enemata ; opiata : si ab graviditate, catheter uti debet : si ab aliis causis, remedia antea memorata quæ iis sunt idonea usurpanda sunt.



#### CAP IV. ISCHURIA URETHRALIS.

##### CHARACTER.

Urinæ suppressio cum tumore hypogastrii circumscripto, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethræ.

##### CAUSAE.

Perinæi tumor ; calculus urethræ impactus ;



pactus; sanguis grumosus, mucus vel pus; urethræ inflammatio; strictura; carunculæ; phymosis; schirrus vel glandulæ prostratæ vitium.

## CURA.

Causæ remotæ sunt amovendæ; si ab calculo oriatur semicupium, fomenta, opiata, enemata emollientia, demulcentia mucilaginosa, sunt utenda; his nihil valentibus, extrahendus est calculus: si ab strictura proveniat, tinctura ferri muriati, in dosi guttarum decem omni horæ sexta parte, donec solvitur spasmus est utenda: Plurimæ aliæ causæ opem chirurgi postulant: urina arte est evacuanda modis propriis.

## ORDO IV. DIALYSES.

## CHARACTER.

Solutio continui, visu, tactuve manifesta.



## CAP. I. HERPES.

## CHARACTER.

Vesiculæ cuticulares humore aqueo plenæ, vel ulcuscula plurima, gregalia, pruriginosa, serpentia; nunc humida, nunc sicca in squamas furfuraceas raro crustaceas abeuntia.

## CURA.

Acidum vitriolicum; tinctura cantharidis; tinctura veratri; aqua calcis; decoctum ulmi; pilulæ calomelanos compositæ; ulcera sunt inungenda, unguento

guento hydrargyri nitrati vel acido sulphurico octuplo ponderis unguenti adipis suillæ commisto, vel sunt lavanda ferri vitriolati solutione, vel kali sulphurati lotionem.



## CAP. II. TINEA.

### CHARACTER.

In cute capillata ad radices capillorum ulcuscula, humorem in crustam albam friabilem abeuntem fundentia.

### CURA.

Capitis rasura; balneum calidum; epispastica; fontanellæ; hydrargyri nitrati unguentum; emplastrum picis nigræ; solutio kali sulphurati in proportionem drachmarum duarum kali ad aquæ  
K libram,

libram, et remedia interna ad herpem idonea.



### CAP. III. PSORA.

#### CHARACTER.

Pustulæ et ulcuscula lecti calore valde pruriginosa, contagiosa, digitos internos, carpos, artusque infestantia.

#### CURA.

Frictio cum unguento sulphuris vel lavatio corporis partium affectarum arsenici vel hydrargyri muriati solutione, vel acidum vitriolicum interne.

# INDEX MORBORUM.

## A.

AMAUROSIS.....	Page 205
Amenorrhœa.....	116
Anasarca .....	179
Aphthæ.....	98
Apoplexia.....	127
Ascites .....	185
Asthma .....	147
Atrophia Lactantium .....	174

## C.

Carditis .....	46
Catarrhus .....	122
Chlorosis. ....	116
Cholera .....	157
Chorea. ....	141
Colica.....	154
—— Pictonum.....	156
Cynanche maligna .....	30
—— parotidæa .....	38
—— pharyngæa. ....	37
—— tonsillaris.....	28
—— trachealis .....	34
Cystitis .....	61

Diabetes

## D.

Diabetes.....	Page 161
Diaphragmitis.....	46
Diarrhœa.....	159
Dysecœa.....	206
Dysenteria.....	124
Dyspepsia.....	134

## E.

Elephantiasis.....	200
Emphysema.....	176
Enteritis.....	50
Enuresis.....	209
Epilepsia.....	143
Epistaxis.....	102
Erysipelas.....	92
Erythema .. ..	22

## G.

Gastritis.....	46
Gonorrhœa.....	194

## H.

Hæmatemesis.....	119
Hæmaturia.....	121
Hæmoptysis.....	103
Hæmorrhagia.....	99
Hæmorrhœis.....	110
Hectica.....	18
Hepatitis.....	52
Hepatitis.....	

Hepatitis chronica . . . . .	Page 55
Herpes . . . . .	216
Hydrocephalus . . . . .	181
Hydrophobia . . . . .	165
Hydrothorax . . . . .	185
Hypochondriasis . . . . .	137
Hysteria . . . . .	163
Hysteritis . . . . .	60

## I.

Icterus . . . . .	202
Intermittentes . . . . .	1
Ischuria renalis . . . . .	210
—— ureterica . . . . .	211
—— urethralis . . . . .	214
—— vesicalis . . . . .	212

## L.

Lepra . . . . .	201
Leucorrhœa . . . . .	115

## M.

Mania . . . . .	170
Melancholia . . . . .	167
Menorrhagia . . . . .	112
Miliaria . . . . .	94

## N.

Nephritis . . . . .	57
---------------------	----

Ophthalmia

## O.

Ophthalmia membranarum .....	Page 22
———— tarsi .....	25

## P.

Palpitatio .....	147
Paralysis.....	130
Pemphigus .....	97
Peripneumonia notha .....	44
Peritonitis .....	46
Pertussis.....	151
Pestis .....	89
Phlegmone .....	19
Phrenitis .....	26
Phthisis .....	105
Pneumonia . . . . .	39
Podagra .....	66
———— aberrans .....	73
———— atonica .....	70
———— retrocedens .....	71
Psora .....	218
Pyrosis .....	153

## Q.

Quartana .....	5
Quotidiana .....	ib.

## R.

Rachitis.....	189
	Remittens



Remittens. ....	Page 18
Rheumatismus acutus .....	62
———— chronicus.....	64
Rubeola.....	82

## S.

Scarlatina.....	85
———— anginosa.....	86
Scorbutus .....	197
Scrofula.....	189
Splenitis.....	57
Suppressio mensium.....	118
Syncope.....	133
Synocha .....	5
Synochus .....	17
Syphilis.....	193

## T.

Tabes .....	173
Tertiana.....	1
Tetanus.....	139
Tinea.....	217
Tympanites.....	177
Typhus gravior .....	12
———— mitior.....	8

## U.

Urticaria.....	96
----------------	----

Varicella

## V.

Varicella . . . . .	Page 80
Variolæ benignæ . . . . .	75
——— malignæ . . . . .	78

FINIS.

~~~~~  
Excudebat Gulielmus Nicholson, Warner Street.



